

Nurofen dla dzieci Junior Zawiesina doustna o smaku truskawkowym 100 ml



Cena: 36,37 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	NUROFEN
Opakowanie	100 ml (butelka)
Postać	Zawiesina doustna
Producent	RECKITT BENCKISER POLAND S.A.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwgorączkowe, Przeciwzapalne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla młodzieży

Opis produktu

Opis

Nurofen dla dzieci Junior o truskawkowym smaku to doustna zawiesina lecznicza. Jego aktywnym składnikiem jest ibuprofen, należący do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Lek ten posiada właściwości przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne.

Nurofen Junior jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat, skuteczny w leczeniu gorączki o różnym pochodzeniu oraz łagodnych do umiarkowanych bólach różnego rodzaju.

Wskazania

- objawowe, krótkotrwałe leczenie bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego,
- objawowe, krótkotrwałe leczenie gorączki.

Działanie

Przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne.

Dawkowanie

- Dzieci w wieku 6-9 lat (20-30 kg): 5 ml 3 razy na dobę.
- Dzieci w wieku 9-12 lat (30-40 kg): 7,5 ml 3 razy na dobę.

Skład

1 ml zawiesiny doustnej zawiera:

- substancję czynną: 40 mg ibuprofenu,
- substancje pomocnicze: kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, sodu chlorek, sacharynę sodową, polisorbát 80, bromek domifenu, maltitolciekły (E965), glicerol, gumę ksantan, aromat truskawkowy 500244E (zawierający glikol propylenowy, kwas askorbowy E300 i identyczne z naturalnym substancje aromatyczne) i wodę oczyszczoną.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Nurofen dla dzieci Junior:

- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na ibuprofen lub inne podobne leki przeciwbólowe (z grupy NLPZ) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeśli kiedykolwiek wystąpiła duszność, astma, katar lub pokrzywka po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych podobnych leków przeciwbólowych (z grupy NLPZ),
- jeśli kiedykolwiek wystąpiło krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego związana z wcześniejszym stosowaniem leków z grupy NLPZ,
- jeśli obecnie występuje lub występowało owrzodzenie żołądka i (lub) dwunastnicy (choroba wrzodowa) lub krwawienie (dwa lub więcej potwierdzone przypadki owrzodzenia lub krwawienia),
- jeśli występuje ciężka niewydolność wątroby, nerek lub serca,
- jeśli występuje krwawienie w mózgu (krwawienie z naczyń mózgowych) lub inne czynne krwawienie,
- jeśli występują zaburzenia krzepnięcia krwi, ponieważ ibuprofen może wydłużyć czas krwawienia,
- jeśli u pacjenta występują zaburzenia wytwarzania krwi o nieustalonym pochodzeniu.

Działania niepożądane

Często występujące działania niepożądane:

- zgaga,
- bóle brzucha,
- nudności,
- niestrawność, (mogą
- biegunka,
- wymioty,
- wzdęcia,
- zaparcia.

Niezbyt często występujące działania niepożądane:

- reakcje nadwrażliwości z pokrzywką i świądem,
- równe wysypki skórne,
- zaburzenia widzenia,
- bóle głowy,
- zawroty głowy,
- bezsennaść,
- pobudzenie,
- drażliwość lub zmęczenie.

Rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 1000 osób):

- szumy uszne,
- zmniejszenie stężenia hemoglobiny,
- zwiększenie stężenia mocznika we krwi,
- zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi.

Ostrzeżenia

- Jeśli dziecko przeżyło ostatnio poważny zabieg chirurgiczny,
- Jeśli dziecko jest odwodnione, ze względu na zwiększone ryzyko niewydolności nerek u dzieci odwodnionych.
- Jeśli u dziecka występowało lub występuje astma lub choroby alergiczne, które mogą powodować duszność.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25oC.
- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

Producent

RECKITT BENCKISER POLAND SA
Wołoska 22
Warszawa