

# Opokan Actigel Lek przeciwbólowy i przeciwzapalny 50 g

Cena: 12,10 zł



## Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	OPOKAN
Opakowanie	50 g
Postać	Żel
Producent	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Ból, Zapalenie
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 3 lat

## Opis produktu

### Opis

**Opokan Actigel** to lek przeciwbólowy i przeciwzapalny w postaci żelu przeznaczonego do stosowania na skórę. Preparat leczniczy zawiera naproksen, który należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Stosowany miejscowo, żel zmniejsza ból mięśni i stawów spowodowane urazami, dolegliwościami związanymi z chorobą zwyrodnieniową stawów, a także reumatoidalnym zapaleniem stawów.

### Wskazania

Bóle pourazowe mięśni i stawów (skręcenia, zwichnięcia, stłuczenia), bóle kręgosłupa, bóle w chorobie zwyrodnieniowej stawów i w reumatoidalnym zapaleniu stawów.

### Działanie

Przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe.

### Dawkowanie

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego. Niewielką ilość żelu (około 5cm wyciśniętego paska) należy nakładać na bolące miejsca 4-5 razy na dobę, delikatnie wcierając aż do całkowitego wchłonięcia żelu. Maksymalna dawka dobową naproksenu podawana miejscowo wynosi 500mg (około 25cm wyciśniętego paska żelu).

### Skład

1g żelu zawiera: substancję czynną: naproksen 100mg (w postaci naproksenu sodowego), oraz substancje pomocnicze: dimetylosulfotlenek, etanol 96%, glikol propylenowy, hydroksypropyloceluloza, woda oczyszczona.

### Przeciwwskazania

Nie stosować Opokanu Actigel u pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą oraz na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) i salicylany. Przeciwwskazaniem do zastosowania leku jest uszkodzona skóra

(skaleczenia, otwarte, sączące rany, wypryski).

#### Ostrzeżenia

- Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem w przypadku: niewydolności wątroby i/lub nerek, choroby wrzodowej żołądka i/lub dwunastnicy, zaburzeń krzepnięcia, niewydolności krążenia, podeszłego wieku pacjenta (powyżej 65 lat).
- Nie należy stosować leku na dużą powierzchnię skóry oraz przez długi czas, ponieważ naproksen wchłania się do krwi i może spowodować wystąpienie objawów niepożądanych.

#### Producent

AFLOFARM  
Partyzancka 133/151  
Pabianice

#### Galeria

