

# Otrivin Allergy 2,5 mg + 0,25 mg Aerozol do nosa 15 ml



Cena: 28,35 zł

## Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	OTRIVIN
Opakowanie	15 ml (but.)
Postać	Aerozol
Producent	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Udrażniające nos
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

## Opis produktu

### Opis

Aerozol do nosa **Otrivin Allergy** został stworzony, aby skutecznie radzić sobie z dokuczliwym katarciem, będącym symptomem zarówno alergii, jak i przeziębienia. Produkt ten jest przeznaczony do aplikacji bezpośrednio na błonę śluzową nosa. Szybko redukuje przekrwienie tej błony, co skutkuje udrożnieniem nosa i ułatwieniem procesu oddychania.

### Wskazania

Lek Otrivin Allergy (2,5 mg + 0,25 mg)/ ml aerozol do nosa stosuje się u dzieci powyżej 6 roku życia i dorosłych:

- w leczeniu objawów przeziębienia, przekrwienia błony śluzowej nosa, ostrego i przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa, sezonowego i niesezonowego zapalenia błony śluzowej nosa,
- wspomagająco w ostrym i przewlekłym zapaleniu zatok i w zapaleniu ucha środkowego,
- w pielęgnacji przed- i pooperacyjnej w chirurgii nosa.

### Działanie

Zmniejsza przekrwienie błony śluzowej nosa.

### Dawkowanie

- Dzieci w wieku od 6 do 12 lat (pod nadzorem dorosłych): 1 - 2 dawki do każdego otworu nosowego 3 do 4 razy na dobę.
- Dorośli oraz dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1 do 2 dawek do każdego otworu nosowego 3 do 4 razy na dobę; ostatnią dawkę zaleca się przyjmować krótko przed snem.

### Skład

1 ml roztworu zawiera:

- substancje czynne: fenylefrynę 2,5 mg; dimetyndenu maleinian 0,25 mg;
- substancje pomocnicze: benzalkoniowy chlorek, sodu wodorofosforan bezwodny, kwas cytrynowy jednowodny, sorbitol, olejek lawendowy deterpenowany, wodę oczyszczoną.

### Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Otrivin Allergy:

- u pacjentów uczulonych na fenylefrynę, dimetyndenu maleinian lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeśli u pacjenta występuje zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa (przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa z powstawaniem strupów),
- u pacjentów przyjmujących obecnie lub którzy w ciągu 14 dni stosowali inhibitory monoaminoooksydazy,
- w przypadku osób z jaskrą z wąskim kątem przesączania,
- u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

### Działania niepożądane

Rzadko występujące działania niepożądane niepożądane: dyskomfort w nosie, suchość nosa, krwawienie z nosa, pieczenie w miejscu podania.

### Ostrzeżenia

- Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem w przypadku pacjentów cierpiących na: choroby serca, nadczynność tarczycy, cukrzycę, rozrost gruczołu krokowego, padaczkę.
- W przypadku osób z nadwrażliwością na adrenomimetyki (np. epinefryna, efedryna), która objawia się bezsennością, zawrotami głowy, drżeniem, zaburzeniami rytmu serca lub zwiększonym ciśnieniem krwi, przed użyciem leku należy skonsultować się z lekarzem.
- Otrivin Allergy zawiera chlorek benzalkoniowy, prowadzący do podrażnienia błon śluzowych.
- Otrivin Allergy zawiera sorbitol, więc nie należy stosować go u pacjentów z dziedziczną nietolerancją fruktozy. Ponadto, jeśli pacjent posiada zdiagnozowaną nietolerancję niektórych cukrów, przed zastosowaniem leku powinien skonsultować się z lekarzem. Jedna dawka leku zawiera 5 µg sorbitolu, który jest źródłem 1,25 µg fruktozy.

### Producent

NOVARTIS CONSUMER  
Marynarska 15  
Warszawa

## Galeria

