


Oxalin Junior 0,05% żel do nosa 0,5 mg/g butelka 10g z dozownikiem



Cena: 22,97 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	OXALIN
Opakowanie	10 g
Postać	żel do nosa
Producent	WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.
Przeznaczenie	Przeciwobrzękowe, Udrażniające nos
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży

Opis produktu

Opis

Preparat Oxalin 0,05% to lek zawierający chlorowoderek oksymetazolin. Gdy jest stosowany miejscowo na błonę śluzową nosa, wywołuje zwężenie naczyń krwionośnych, redukcję obrzęku błony śluzowej nosa oraz ograniczenie nadmiernego wydzielania.

Wskazania

- Zapalenie błony śluzowej nosa (ostre, naczynioruchowe, alergiczne).
- Zapalenie zatok przynosowych.
- Zapalenie trąbki słuchowej i/lub ucha środkowego.

Działanie

- Poprawa drożności przewodów nosowych.
- Ułatwienie odpływu wydzieliny z zatok przynosowych.

Dawkowanie

- Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1 dawka do każdego otworu nosowego dwa do trzech razy na dobę. Nie należy stosować leku częściej niż 3 razy na dobę.
- Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 1 dawka do każdego otworu nosowego dwa razy na dobę. Nie należy stosować leku częściej niż 2 razy na dobę.

Skład

1 g żelu do nosa zawiera:



- substancję czynną: oksymetazoliny chlorowodorek 0,5 mg,
- pozostałe składniki: sodu chlorek; disodu fosforan dwunastowodny; sodu diwodorofosforan jednowodny; disodu edetynian; hydroksyetyloceluloza; glicerol; benzalkoniowy chlorek, roztwór; woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Oxafin 0,05%:

- jeśli pacjent ma uczulenie na którykolwiek składnik leku;
- jeśli pacjent ma suche zapalenie błony śluzowej nosa (zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa z tworzeniem się strupów).

Działania niepożądane

- Często: -pieczenie w miejscu podania, suchość błony śluzowej nosa, kichanie.
- Niezbyt często: - kołatanie serca, przyspieszenie czynności serca; - zwiększenie ciśnienia tętniczego.
- Rzadko: - niepokój ruchowy, bezsenność, bóle głowy; - zmęczenie; -silne uczucie "zatkania nosa" w wyniku nasilenia obrzęku błony śluzowej nosa (występuje po ustaniu działania leku, jako objaw przekrwienia reaktywnego).

Ostrzeżenia

- Lek zawiera w składzie chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienie błony śluzowej nosa.
- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
- Okres ważności leku po pierwszym otwarciu butelki wynosi 12 tygodni.

Producent

POLFA WARSZAWA
Karolkowa 22/24
Warszawa