


# Pangrol 10 000, 50 kapsułki



Cena: 42,46 zł

## Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	50 kapsułek
Postać	Kapsułki
Producent	BERLIN CHEMIE AG
Przeznaczenie	Trawienie
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

## Opis produktu

### Opis

Lek Pangrol 10 000 zawiera enzymy trawienne pochodzące z pobrania. Te enzymy są niezbędne do trawienia i wchłaniania pokarmu w pokarmie.

### Wskazania

Uzupełnianie enzymów trzustkowych w zaburzeniach trawienia wynikających z braku lub niedostatecznego wydzielania i (lub) działania enzymów trzustkowych w dwunastnicy.

### Działanie

Uzupełnienie enzymów trzustkowych u osób z zaburzeniami trawienia wynikającymi z braku lub niedostatecznego wydzielania i (lub) działania enzymów trzustkowych w dwunastnicy.

### Dawkowanie

Zalecana dawka lipazy u dorosłych wynosi 20 000-40 000 j. Ph. Eur. na jeden posiłek, o ile lekarz nie zaleci innego dawkowania, należy przyjmować od 2 do 4 kapsułek na każdy posiłek (co odpowiada od 20 000 do 40 000 j. Ph. Eur. na jeden posiłek). Dawkowanie u dzieci ustala lekarz.

### Skład

1 kapsułka zawiera substancje czynną pankreatynę o aktywności enzymatycznej: lipazy 10000 j.Ph.Eur., amylazy 9000 j.Ph.Eur., proteazy 500 j.Ph.Eur. oraz substancje pomocnicze: kroskarmeloza sodowa; celuloza mikrokrystaliczna; olej rycynowy, utwardzany; krzemionka koloidalna bezwodna; magnezu sterynian; 30% wodna zawiesina kopolimeru etyloakrylanu z kwasem metakrylowym (1:1), typ C; trietylu cytrynian; symetykonu emulsja 30%; talk; kapsułka: żelatyna; żelaza tlenek czerwony (E 172); żółcień chinolinowa (E 104); żelaza tlenek żółty (E 172); indygotyna (E 132); tytanu dwutlenek (E 171).

### Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Pangrol 10 000:

- u pacjentów z nadwrażliwością na wieprzowinę lub inny składnik leku Pangrol 10 000,
- u pacjentów z ostrym zapaleniem trzustki i ostrymi napadami w przebiegu przewlekłego zapalenia trzustki, w fazie zaostrzenia choroby.

#### Ostrzeżenia

- Lek Pangrol 10 000 zawiera czynne enzymy, które w przypadku uwolnienia w jamie ustnej, na przykład po rozgryzieniu kapsułki, mogą prowadzić do uszkodzenia (owrzodzeń) błony śluzowej jamy ustnej. Dlatego należy zachować ostrożność i przyjmować lek wyłącznie w sposób zgodny z opisaniem.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Chronić od światła i wilgoci.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

#### Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.