

Paracetamol czopki 250 mg, 10 czopków

Cena: 4,81 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	PARACETAMOL
Opakowanie	10 czopków
Postać	Czopki
Producent	FARMINA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwgorączkowe
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Preparat **Paracetamol Farmina w dawce 250 mg** to lek dostępny w postaci czopków doodbytniczych, charakteryzujący się działaniem przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Jest przeznaczony do użytku u dzieci w celu łagodzenia bólu o różnym pochodzeniu oraz obniżania gorączki w przypadku różnych infekcji i po szczepieniu. Forma czopków umożliwia podawanie leku nawet w przypadku wymiotów u dziecka oraz podczas snu, szczególnie gdy temperatura ciała jest wysoka.

Wskazania

Lek Paracetamol Farmina 250 mg stosuje się:

- w bólach różnego pochodzenia, np. bóle zębów, głowy, bóle mięśni i stawów, bóle po zabiegach chirurgicznych,
- w objawowym leczeniu przeziębienia i grypy,
- w celu obniżenia gorączki przy różnych infekcjach oraz po szczepieniach.

Działanie

Przeciwbólowe, przeciwgorączkowe.

Dawkowanie

Dzieci o wadze od 16,6 kg do 25 kg (od około 3 do 7 lat): 1 czopek 3 do 4 razy na dobę.

Skład

1 czopek zawiera:

- substancję czynną: paracetamol 250 mg,
- substancję pomocniczą: tłuszcz stały.



Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku w przypadku: nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu; ciężkiej niewydolność nerek i (lub) wątroby; choroby alkoholowej.

Działania niepożądane

- Działania niepożądane występujące rzadko: zaburzenia skóry i tkanki podskórnej takie jak: świąd, pokrzywka, wysypka, rumień, obrzęk naczynioruchowy.
- Działania niepożądane występujące bardzo rzadko: zaburzenia krwi i układu chłonnego takie jak: zmiany w obrazie morfologicznym krwi (trombocytopenia z objawami plamicy trombocytopenicznej); zaburzenia wątroby i dróg żółciowych takie jak: upośledzenie czynności wątroby; zaburzenia nerek i dróg moczowych takie jak: upośledzenie czynności nerek.

Ostrzeżenia

- Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek oraz u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej.
- Podwyższone ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje również u pacjentów głodzonych i regularnie pijących alkohol.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci w temperaturze poniżej 25°C.

Producent

FARMINA
Lipska 44
Kraków