

Paracetamol Farmina 125 mg, 10 czopków

Cena: 4,21 zł



Opis słownikowy

| | |
|-----------------|---|
| Dla kogo | Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn |
| Marka | PARACETAMOL |
| Opakowanie | 10 czopków |
| Postać | Czopek |
| Producent | FARMINA SP. Z O.O. |
| Przeznaczenie | Przeciwbólowe, Przeciwgorączkowe |
| Rodzaj produktu | Lek bez recepty |
| Wiek | Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów |

Opis produktu

Opis

Preparat **Paracetamol Farmina 125 mg** to lek dostępny w formie czopków, wykazujący działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, przeznaczony do stosowania u niemowląt oraz dzieci. Głównym składnikiem aktywnym jest paracetamol.

Wskazania

Lek Paracetamol Farmina 125 mg stosuje się w:

- bólach i gorączka różnego pochodzenia, np. podczas ząbkowania, po szczepieniach,
- leczeniu objawowym stanów grypopodobnych i przeziębień.

Działanie

Lek Paracetamol Farmina działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo.

Dawkowanie

Dzieci o wadze od 8,3 kg do 12,5 kg (od około 9 do 24 miesiąca): 1 czopek 3 do 4 razy na dobę.

Skład

1 czopek zawiera:

- substancję czynną: paracetamol (Paracetamolum 125 mg),
- substancja pomocnicza: tłuszcz stały.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku w przypadku: nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu; ciężkiej niewydolność nerek i (lub) wątroby; choroby alkoholowej.



Działania niepożądane

- Działania niepożądane występujące rzadko: zaburzenia skóry i tkanki podskórnej takie jak: świąd, pokrzywka, wysypka, rumień, obrzęk naczynioruchowy.
- Działania niepożądane występujące bardzo rzadko: zaburzenia krwi i układu chłonnego takie jak: zmiany w obrazie morfologicznym krwi (trombocytopenia z objawami plamicy trombocytopenicznej); zaburzenia wątroby i dróg żółciowych takie jak: upośledzenie czynności wątroby; zaburzenia nerek i dróg moczowych takie jak: upośledzenie czynności nerek.

Ostrzeżenia

- Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek oraz u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej.
- Podwyższone ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje również u pacjentów głodzonych i regularnie pijących alkohol.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci w temperaturze poniżej 25°C.

Producent

FARMINA
Lipska 44
Kraków