

# Paracetamol Zawiesina doustna smak truskawkowy 100 ml



Cena: 7,12 zł

## Opis słownikowy

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| Dla kogo        | Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn |
| Opakowanie      | 100 ml                                |
| Postać          | Zawiesina                             |
| Producent       | AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.   |
| Przeznaczenie   | Przeciwbólowe, Przeciwgorączkowe      |
| Rodzaj produktu | Lek bez recepty                       |
| Wiek            | Dla dziecka, Dla młodzieży, Od 2 lat  |

## Opis produktu

### Opis

**Aflofarm Paracetamol** to lek dostępny w formie smacowej zawiesiny doustnej o truskawkowym smaku, działający przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Preparat jest zalecany do stosowania w przypadku gorączki, takiej jak w przeziębieniu i grypie, oraz w bólach o różnym pochodzeniu o niewielkim i umiarkowanym nasileniu. Substancją czynną w tym leku jest paracetamol.

### Wskazania

- Gorączka w przebiegu przeziębienia i grypy.
- Bóle różnego pochodzenia o małym i umiarkowanym nasileniu: bóle głowy, bóle zębów, bóle związane z ząbkowaniem, bóle po zabiegach stomatologicznych i chirurgicznych, bóle mięśniowe, bóle kostno-stawowe.

### Działanie

Przeciwbólowe, przeciwgorączkowe.

### Dawkowanie

- Dzieci od 3. do 12. miesiąca życia: 2,5-5 ml zawiesiny.
- Dzieci od 1. do 6. roku życia: 5-10 ml zawiesiny.
- Dzieci od 6. do 12. roku życia: 10-20 ml.

### Skład

5 ml zawiesiny zawiera:

- substancję czynną: paracetamol 120 mg,
- substancje pomocnicze: polisorbat 80, sacharoza, guma ksantan, sacharyna sodowa, sodu benzoesan, kwas cytrynowy bezwodny, czerwień koszenilowa (E 124), substancja poprawiająca smak i zapach truskawkowa (AR 0012/F), woda oczyszczona.

### Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Paracetamol Aflofarm:

- w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeśli u pacjenta zdiagnozowano wirusowe zapalenie wątroby, ciężką niewydolność nerek i/lub wątroby,
- w przypadku choroby alkoholowej.

### Działania niepożądane

- Rzadko występujące działania niepożądane: świąd, rumień, pokrzywka, wysypka, duszność, wymioty, nudności, zaburzenia czynności wątroby, żółtaczką, pocenie się.
- Bardzo rzadko występujące działania niepożądane: zaburzenia w obrazie krwi jak małopłytkowość, agranulocytoza, granulocytopenia, kolka nerkowa, niewydolność nerek.

### Ostrzeżenia

- Lek zawiera paracetamol. Nie należy stosować tego leku z innymi zawierającymi paracetamol.
- Stosowanie leku omówić z lekarzem jeśli stwierdzono u pacjenta zaburzoną czynność nerek lub wątroby.
- Bez konsultacji z lekarzem leku nie stosować dłużej niż: 10 dni - w przypadku bólu, 3 dni - w przypadku gorączki, 2 dni - w przypadku objawów związanych z przeziębieniem.
- Nie należy łączyć paracetamolu i alkoholu.
- Stosowanie leku u dzieci poniżej 2 lat skonsultować z lekarzem.
- Lek zawiera czerwień koszenilową, która może powodować reakcje alergiczne.
- Lek zawiera sacharozę - należy to wziąć pod uwagę w przypadku cukrzycy.
- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

### Producent

AFLOFARM  
Partyzancka 133/151  
Pabianice

### Galeria

