

## Parafina ciekła - Avena 100 g



Cena: 6,21 zł

### Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	100 g
Postać	Płyn
Producent	FARMINA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Zaparcia
Rodzaj produktu	Produkt leczniczy
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

### Opis produktu

#### Opis

**Parafina ciekła** z Laboratorium Farmaceutycznego Avena to lek, który zawiera zieloną parafinę ciekłą (Paraffinum liquidum). Może być możliwe doustnie, jak i zewnętrznie na wodzie.

Jeśli jest przyjmowana doustnie, parafina ciekła działa jako środek przeczyszczający. Tworzywa wtórne na zewnątrz obudowy i rozmiękcza masa kałowa, co ułatwia proces wypróżniania. Ważne jest, że nie szkodzi błony śluzowej jelita i nie jest ani trawiona, ani wchłaniana przez organizm. Działanie przeczyszczające zwykle po kilku godzinach, około 6-8 godzin po zastosowaniu.

Jeśli jest usuwany miejscowo na skórę, parafina ciekła działa jako środek natłuszczający, powodujący uszkodzenie na skutek. Chroniczne działanie przed wystąpieniem czynników zewnętrznych. Opakowanie w formie butelki z kroplomierzem jest wygodnym w użyciu, udostępnianym dawkowaniem produktu.

#### Wskazania

Parafinę ciekłą stosuje się:

- doustnie w zaparciach jako środek przeczyszczający (zgodnie z zaleceniami lekarza),
- zewnętrznie do miejscowego nacierania skóry.

#### Działanie

Przeczyszczające, natłuszczające.

#### Dawkowanie

- Doustnie u dorosłych: przyjmować 15-30 ml (1-2 łyżek stołowych) leku zwykle przed snem, chyba że lekarz zaleci inaczej. Działanie przeczyszczające występuje zazwyczaj po 6-10 godzinach od zastosowania.
- Zewnętrznie na skórę u dorosłych i dzieci: niewielką ilość parafiny ciekłej należy nanieść na wybrane miejsca i wetrzeć w skórę, stosować według potrzeb.

#### Skład



1 g płynu zawiera:

- substancję czynną: parafina ciekła (Paraffinum liquidum) 1 g.

#### Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na parafinę ciekłą.
- Ból brzucha o nieustalonej przyczynie oraz ostre stany zapalne przewodu pokarmowego, np. zapalenie wyrostka robaczkowego.
- Leku nie należy podawać dzieciom i kobietom w ciąży bez porozumienia z lekarzem.

#### Działania niepożądane

- Świąd odbytu,
- Często wycieki parafiny z odbytu,

#### Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

#### Producent

Farmina Sp. z o.o.  
ul. Lipska 44  
30-721 Kraków