

Pedicetamol 60 ml



Cena: 1,06 zł

Opis słownikowy

| | |
|-----------------|--|
| Dla kogo | Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn |
| Marka | PEDICETAMOL |
| Opakowanie | 60 ml |
| Postać | Roztwór |
| Producent | POLSKI LEK DYSTRYBUCJA |
| Przeznaczenie | Przeciwbólowe, Przeciwgorączkowe |
| Rodzaj produktu | Lek bez recepty |
| Wiek | Dla dziecka, Dla niemowlaka, Od 1 dnia życia |

Opis produktu

Opis

Pedicetamol to lek w formie roztworu doustnego, specjalnie przeznaczony dla dzieci o masie ciała do 32 kg. Jego zastosowanie obejmuje obniżanie gorączki trwającej maksymalnie 3 dni oraz łagodzenie bólu o stopniu nasilenia od łagodnego do umiarkowanego.

Wskazania

Leczenie gorączki trwającej nie dłużej niż 3 dni oraz bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego, dla niemowląt i dzieci do 32 kg (w przybliżeniu od pierwszego dnia życia do 10. lat).

Działanie

Przeciwbólowe, przeciwgorączkowe.

Dawkowanie

- Dzieci poniżej 3. roku życia: paracetamol powinien być stosowany wyłącznie z zalecenia lekarza, zaleca się podawanie roztworu doustnego w postaci kropli (4 mg/kroplę), za pomocą zakraplacza dołączonego do opakowania 30 ml.
- Dzieci od 3. roku życia: zaleca się podawanie roztworu doustnego w mililitrach (ml), za pomocą strzykawki dołączonej do opakowania 60 ml.

Skład

1 ml roztworu zawiera:

- substancję czynną: paracetamol 100 mg,
- substancje pomocnicze: bmakrogol 600, glicerol, aromat malinowy (glikol propylenowy, alkohol etylowy i alkohol benzylowy), sacharyna sodowa, azorubina (karmiozyna) (E122) i woda oczyszczona.

Przeciwwskazania



Kiedy nie stosować leku Pedicetamol:

- w przypadku uczulenia na substancję czynną - paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Działania niepożądane

- Rzadko występujące działania niepożądane: złe samopoczucie, niedociśnienie, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych.
- Bardzo rzadko występujące działania niepożądane: uszkodzenie wątroby, hipoglikemia, mętny mocz, zmiany liczby krwinek (neutropenia, leukopenia), reakcje skórne.

Ostrzeżenia

- Podczas stosowania leku, nie należy przekraczać zalecanej jednorazowej i dobowej dawki.
- W przypadku zaburzonej czynności nerek, wątroby, serca, płuc, niedokrwistości należy stosowanie leku omówić z lekarzem.
- W przypadku wysokiej gorączki (powyżej 39oC) należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.
- Jeśli ból i gorączka utrzymuje się dłużej niż 3 dni lub pojawią się inne objawy, należy skonsultować się z lekarzem.
- Lek zawiera azorubinę (E 122), która może wywoływać reakcje alergiczne.
- Lek zawiera niewielką ilość etanolu (alkoholu), mniej niż 100 mg na dawkę.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Po otwarciu, zawartość butelki powinna zostać zużyta maksymalnie w ciągu 6 miesięcy.

Producent

Polski Lek-Dystrybucja Sp. z o.o.
Chopina 10
34-100 Wadowice