

# Pikopil 7,5 mg, 10 tabletek

Cena: 18,32 zł



## Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	PIKOPIŁ
Opakowanie	10 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	FARMAK INTERNATIONAL SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Zaparcia
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 10 lat

## Opis produktu

### Opis

**Tabletki Pikopil** to lek przeczyszczający, który zawiera pikosiarżan sodu jako składnik czynny. Jest urządzeniem usuwającym, łagodzącym problemy związane z nawracającymi lub zastępczymi zaparciami. Lek jest przeznaczony zarówno dla dorosłych, jak i dzieci powyżej 10 roku życia.

### Działanie

Pikopil należy do grupy leków przeczyszczających o działaniu drażniącym. Działa poprzez stymulację ruchów jelita oraz zwiększa zawartość wody i elektrolitów w świetle jelita grubego.

### Dawkowanie

- Dorośli: 5 mg - 7,5 mg (rozpoczęte od podawania podobnego leku o mniejszej mocy, zwiększone do 1 tabletki produktu Pikopil o mocy 7,5 mg), przed snem.
- Dzieci (od 10 r. ż.) i młodzież: 5 mg - 7,5 mg (rozpoczęte od podawania podobnego leku o mniejszej mocy, zwiększone do 1 tabletki produktu Pikopil o mocy 7,5 mg), przed snem.

### Skład

Każda tabletkę leku Pikopil o mocy 7,5 mg zawiera jednowodny pikosiarżan sodu, co odpowiada 7,5 mg bezwodnego pikosiarżanu sodu. Pozostałe składniki: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, skrobia żelowana kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna, stearynian magnezu.

### Przeciwwskazania

Kiedy nie przyjmować leku Pikopil:

- jeśli pacjent ma uczulenie na sodu pikosiarżan, inne substancje należące do grupy pochodnych triarylomietanu (np. bisakodyl)

lub którykolwiek z

- pozostałych składników tego leku;
- w przypadku ciężkiego odwodnienia (tj. utraty zbyt dużej ilości wody z ustroju);
- jeśli jelito jest zablokowane (niedrożność jelita);
- w przypadku poważnych zaburzeń brzusznych jak zapalenie wyrostka robaczkowego;
- jeśli występuje ostra choroba zapalna jelita;
- jeśli występuje silny ból w jamie brzusznej, który powoduje nudności lub wymioty;
- jeśli tuż przed przyjęciem leku wystąpi nagły, ostry ból brzucha;
- w przypadku problemu zwanego niedrożnością jelita, który występuje w przypadku zablokowania jelita cienkiego.

#### **Dodatkowe informacje**

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.