

## Pluscard Tabletki 60 sztuk

Cena: 12,84 zł



### Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	PLUSCARD
Opakowanie	60 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Zakrzepy
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 16 lat

### Opis produktu

#### Opis

**Pluscard** to lek, który łączy kwas acetylosalicylowy, redukujący skłonność płytek krwi do "zlepiania się", oraz glicynę, która ma funkcję ochronną dla przewodu pokarmowego przed potencjalnie drażniącym działaniem kwasu acetylosalicylowego, a także pomaga w lepszym wchłanianiu tego składnika.

#### Wskazania

Zapobieganie powikłaniom:

- zakrzepowo-zatorowym po przebyłym zawale mięśnia sercowego,
- udarze mózgu,
- zabiegach na naczyniach wieńcowych,
- w dławicy piersiowej.

Zapobieganie zawałowi mięśnia sercowego.

#### Działanie

Przeciwwzakrzepowe.

#### Dawkowanie

- Dorośli i dzieci powyżej 16 lat: doustnie 1-3 tabletek na dobę w dawce pojedynczej lub w dawkach podzielonych. tabletki należy przyjmować w czasie, lub po posiłku i popijać szklanką płynu.
- Osoby w podeszłym wieku: nie ma dokładnych danych na temat stosunku korzyści do ryzyka stosowania kwasu acetylosalicylowego (ASA) w tej grupie pacjentów.
- Pacjenci z niewydolnością nerek i (lub) wątroby: należy zachować ostrożność przy stosowaniu produktu leczniczego u

pacjentów z ciężką niewydolnością nerek i (lub) wątroby.

#### Skład

1 tabletkę zawiera:

- substancje czynne: kwas acetylosalicylowy 100 mg oraz glicyna 40 mg,
- substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, talk.

#### Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Pulscard:

- jeśli pacjent ma uczulenie na kwas acetylosalicylowy, glicynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- w przypadku nadwrażliwości na salicylany lub na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), np. astma aspirynowa, gorączka sienna,
- jeśli pacjent ma czynną chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy, dnę moczaniową, ciężką niewydolność wątroby, nerek, serca

u osób z zwiększoną skłonnością do krwawień oraz zaburzenia krzepnięcia krwi (np. hemofilia, małopłytkowość) oraz gdy pacjent jest leczony jednocześnie lekami przeciwzakrzepowymi (np. pochodnymi kumaryny, heparyną),

- jeśli pacjent ma niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej (choroba genetyczna krwinek czerwonych), gdyż podanie kwasu acetylosalicylowego może spowodować hemolizę – niszczenie krwinek czerwonych lub niedokrwistość hemolityczną – niedokrwistość spowodowaną nadmiernym rozpadem krwinek czerwonych,
- u kobiet w III trymestrze ciąży (trzy ostatnie miesiące ciąży),
- u dzieci poniżej 16 lat.

#### Działania niepożądane

- Zaburzenia serca: niewydolność serca.
- Zaburzenia naczyniowe: nadciśnienie

#### Ostrzeżenia

Przed rozpoczęciem leczenia produktem Pulscard należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

- występują utrzymujące się objawy dzwonienia lub szumu w uszach oraz ból głowy, gdyż w przypadku długotrwałego stosowania leku mogą one wskazywać na jego przedawkowanie, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku,
- planowany jest zabieg chirurgiczny, to należy odstawić lek na 5 do 7 dni wcześniej, aby ograniczyć ryzyko wydłużonego czasu krwawienia podczas oraz po zabiegu,
- występują krwotoki maciczne, nadmierne krwawienia miesiączkowe, stosowana jest wewnątrzmaciczna wkładka antykoncepcyjna,
- pacjent chorował na wrzody żołądka lub dwunastnicy.

#### Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

## Galeria

