

Polibiotic Maść 15 g

Cena: 17,00 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	POLIBIOTIC
Opakowanie	15 g
Postać	Maść
Producent	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Oparzenie, Otarcia, Rana, Skaleczenie, Ukąszenie
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 12 lat

Opis produktu

Opis

Maść Polibiotic jest lekiem przeznaczonym do miejscowego stosowania na skórę. Zaleca się jej używanie w przypadku drobnych obrażeń, takich jak otarcia, zadrapania, ukąszenia, a także przy oparzeniach i owrzodzeniach skóry. Skład maści Polibiotic obejmuje trzy substancje czynne o charakterze antybiotyków: neomycynę, polimyksynę B i bacytracynę. Te składniki działają synergistycznie, co sprawia, że lek posiada kompleksowy zakres działania przeciwbakteryjnego, skierowanego przeciwko bakteriom odpowiedzialnym za większość infekcji skórnych.

Wskazania

Do stosowania przy:

- drobnych ranach takich jak ukąszenia, otarcia i zadrapania,
- oparzeniach,
- owrzodzeniach skóry.

Działanie

Bakteriobójcze (zabezpiecza rany przed zakażeniem).

Dawkowanie

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: skórę zmienioną chorobowo smarować 2-5 razy na dobę.

Skład

1 g maści zawiera:

- 5 mg neomycyny siarczanu (Neomycini sulfas), 5000 j.m. polimyksyny B siarczanu (Polymyxini B sulfas) oraz 400 j.m.

- bacytracyny cynkowej (Bacitracinum zincum).
- wazelina biała.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Polibiotic:

- w przypadku uczulenia na substancje czynne - neomycynę, polimyksynę B, bacytracynę lub pozostały składnik tego leku,
- w przypadku zaburzeń słuchu,
- głębokie rany, rany kłute, ciężkie oparzenia, duże powierzchnie uszkodzonej skóry, zmiany skórne sączące się,
- do oczu, na błony śluzowe,
- u dzieci poniżej 12 lat.

Działania niepożądane

- Objawy nadwrażliwości, np. reakcje skórne typu wysypka, zaczerwienienie, obrzęk, podrażnienie, świąd,
- Uszkodzenie słuchu (potencjalne działanie ototoksyczne),
- Uszkodzenie nerek,
- Zakażenie niewrażliwymi szczepami bakterii lub grzybów.

Ostrzeżenia

- W przypadku wystąpienia objawów nadwrażliwości należy przerwać stosowanie leków oraz skontaktować się z lekarzem.
- Stosowanie leku omówić z lekarzem jeśli: u pacjenta występuje nadwrażliwość na antybiotyki z grupy aminoglikozydowych (streptomycyna, gentamycyna, tobramycyna) lub polimyksyny, jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek.
- Nie należy leku stosować długotrwale ze względu na możliwość namnażania się grzybów i bakterii opornych na lek.
- Stosowanie leku na dużą powierzchnię skóry może prowadzić do uszkodzeń słuchu, nerek i działania toksycznego na układ nerwowy.
- Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby: 7 dni.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Producent

Afłofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice

Galeria

