

# Procto-Glyvenol, 10 czopków

Cena: 37,30 zł



## Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	PROCTO-GLYVENOL
Opakowanie	10 czopków
Postać	Czopki
Producent	RECORDATI IRELAND LTD.
Przeznaczenie	Hemoroidy
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów, Od 18 lat

## Opis produktu

### Opis

**Procto-Glyvenol 400 mg + 40 mg** to lek w postaci czopków, przeznaczony do miejscowego leczenia zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych hemoroidów. Jego aktywnym składnikiem jest Tribenozyd, który wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwobrzękowe, przeciwbólowe, przeciwświądowe oraz chroni śródbłonek naczyń krwionośnych przed uszkodzeniami. Dodatkowo, lek zawiera lidokainę – substancję miejscowo znieczulającą, która pomaga łagodzić dolegliwości związane z hemoroidami, takie jak świąd, pieczenie i ból. Procto-Glyvenol w formie czopków działa bezpośrednio w miejscu zastosowania, nie wywierając znaczącego działania ogólnoustrojowego. Może być stosowany od 4. miesiąca ciąży oraz w okresie karmienia piersią, pod warunkiem przestrzegania zalecanych dawek.

### Wskazania

Lek Procto-Glyvenol 400 mg + 40 mg stosuje się w celu:

- miejscowego leczenia zewnętrznych i wewnętrznych hemoroidów.

### Działanie

Czopki Procto-Glyvenol działają dwukierunkowo. Tribenozyd działa przeciwzapalnie, przeciwobrzękowo, przeciwbólowo, przeciwświądowo, a także przeciwdziała uszkodzeniom śródbłonna naczyniowego. Natomiast lidokaina jest substancją miejscowo znieczulającą i łagodzi dolegliwości spowodowane żylakami odbytu.

### Dawkowanie

Dorośli: doodbytniczo: 1 czopek rano oraz wieczorem.

### Skład

1 czopek zawiera:

- substancję czynną: tribenozyd (Tribenosidum) 400 mg, lidokaina chlorowodorku (Lidocaini hydrochloridum) 40 mg.

- substancje pomocnicze: tłuszcz (Witepsol E85) i tłuszcz (Witepsol W35).

#### **Przeciwwskazania**

Nie stosować czopków Procto-Glyvenol u osób nadwrażliwych na tribenozyd, lidokainę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, albo na inne leki znieczulenia miejscowego o budowie amidowej.

#### **Działania niepożądane**

- pokrzywka,
- świąd w miejscu podania, wysypka w miejscu podania, ból w miejscu podania.

#### **Ostrzeżenia**

- Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Procto-Glyvenol u pacjentów z ciężkim uszkodzeniem wątroby.
- W uzupełnieniu leczenia hemoroidów lekiem Procto-Glyvenol, zaleca się utrzymywanie należytej higieny okolicy odbytu, stosowanie odpowiednich ćwiczeń fizycznych oraz stosowanie odpowiedniej diety w celu utrzymania odpowiednio miękkiej konsystencji stolca.
- Nie wolno stosować leku doustnie. Należy unikać kontaktu z oczami.

#### **Dodatkowe informacje**

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.