

Regevagia Globulki dopochwowe 10 sztuk

Cena: 24,70 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	10 glob.
Postać	glob.dopoch.
Producent	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu

Wskazania

likwiduje suchość błony śluzowej pochwy, regeneruje nabłonek pochwy, utrzymuje fizjologiczne pH

Składniki

glicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych, eter cetostearylowy makrogolu, wyciąg olejowy z kwiatów malwy, hialuronian sodu, masło aloesowe, kwas mlekowy, mleczan sodu, laktoza jednowodna

Stosowanie

Sposób postępowania z wyrobem: Przed zastosowaniem wyrobu medycznego Regevagia należy przeczytać uważnie całą ulotkę z instrukcją użycia, ponieważ zawiera ona ważne informacje..

Tylko do stosowania dopochwowego.

Należy zasięgnąć porady lekarza, jeśli objawy nasilą się w trakcie stosowania Regevagina lub będą się utrzymywać powyżej 7-10 dni. Przed aplikacją dokładnie umyć dłonie.

Kuracja podstawowa: Stosować 1 globulkę dopochwową raz dziennie (na noc) przez 7 dni lub zgodnie z zaleceniami lekarza. Globulkę należy umieścić głęboko w pochwie. Kuracja podtrzymująca: Stosować 1 globulkę dopochwową co 2-3 dni lub zgodnie z zaleceniami lekarza. Globulkę należy umieścić głęboko w pochwie.

Przechowywanie

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Nie stosować wyrobu po upływie daty ważności. Należy zwrócić uwagę na zachowanie odpowiednich warunków przechowywania wyrobu.

Przeciwwskazania

Ostrzeżenia specjalne i zalecane środki ostrożności: Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu. Nie stosować w trakcie menstruacji. Wyrób medyczny Regevagia nie powinien być stosowany jednocześnie z innymi preparatami do



stosowania dopochwowego. Nie stosować łącznie z lateksowymi prezerwatywami lub wkładkami antykoncepcyjnymi. Stosowanie wyrobu z lekami miejscowo znieczulającymi może wydłużyć okres znieczulenia. W przypadku ostrej infekcji pochwy należy zasięgnąć porady lekarza. W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem skonsultować się z lekarzem.

Możliwe działania niepożądane: W przypadku wystąpienia objawów słabego działania drażniącego, świądu, pieczenia, wysypki lub innych objawów nadwrażliwości należy zaprzestać stosowania wyrobu i zasięgnąć porady lekarza.

Producent

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Opis

Regevagia Globulki dopochwowe 10 sztuk