

# Reparil, 40 tabletek

Cena: 31,86 zł



## Opis słownikowy

|                 |   |
|-----------------|---|
| Dla kogo        | Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn                             |
| Marka           | REPARIL   |
| Opakowanie      | 40 tabletek   |
| Postać          | Tabletka  |
| Producent       | MYLAN HEALTHCARE SP. Z O.O.                                       |
| Przeznaczenie   | Obrzęk, Stłuczenie  |
| Rodzaj produktu | Lek bez recepty   |
| Wiek            | Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 7 lat |

## Opis produktu

### Opis

**Reparil** jest lekiem w postaci tabletek, który stosuje się w łagodzeniu obrzęków po miejscowych urazach. Lek Reparil przeznaczony jest dla dorosłych oraz dzieci powyżej 7. roku życia.

### Wskazania

Preparat stosowany w obrzękach po miejscowych urazach

### Działanie

Przeciwobrzękowe.

### Dawkowanie

- Dorośli i młodzież od 14. roku życia: 2 tabletki 3 razy na dobę.
- Dzieci od 7. do 14. roku życia: 1 tabletki, 2 lub 3 razy na dobę.

### Skład

1 tabletki zawiera:

- substancje czynne: beta-escyna 20 mg,
- substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, powidon (K 29-32), magnezu stearynian, skład otoczki: sacharoza, talk, guma arabska, tytanu dwutlenek (E171), krzemionka koloidalna bezwodna, kopolimer kwasu metakrylowego i akrylanu etylu (Eudragit L 100-55), makrogol 8000, sodu wodorotlenek, karmeloza sodowa, trietylu cytrynian, symetykon emulsja, wosk biały, wosk Carnauba.

### Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Reparil:

- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na escynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeśli u pacjenta występuje niewydolność lub zaburzenia nerek,
- u dzieci w wieku poniżej 7 lat,
- w okresie ciąży i karmienia piersią.

#### Działania niepożądane

- reakcje nadwrażliwości takie jak pokrzywka.
- zaburzenia czynności przewodu pokarmowego.

#### Ostrzeżenia

- Ostrzeżenia i środki ostrożności
- W przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości, lek Reparil należy odstawić.
- Reparil zawiera laktozę jednowodną i sacharozę - stosowanie leku omówić z lekarzem w przypadku stwierdzonej nietolerancji niektórych cukrów.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

#### Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.