


# Reparil żel 40 g

Cena: 29,52 zł



## Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	REPARIL
Opakowanie	40 g
Postać	Żel
Producent	MYLAN HEALTHCARE SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Krwiaki, Siniaki, Stłuczenie
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

## Opis produktu

### Opis

Reparil N Gel to lek leczniczy wykorzystywany w terapii wspomagającej w przypadkach urazów, takich jak stłuczenia, krwiaki, zgniecenia oraz urazy stawów.

### Wskazania

Lek Reparil Gel N stosuje się wspomagająco celu leczenia:

- dolegliwości pourazowych takich jak stłuczenia, krwiaki, zgniecenia, urazy stawów.

### Działanie

Łagodzące dolegliwości pourazowych takich jak stłuczenia, krwiaki, zgniecenia, urazy stawów.

### Dawkowanie

Żel nakładać 1-3 razy dziennie na chore miejsce i jego okolicę. Stosować przez okres 1-2 tygodni (do ustąpienia objawów).

### Skład

100 g żelu zawiera:

- substancje czynne: beta-escyny 1,0 g oraz salicylanu dietyloaminy 5,0 g,
- pozostałe składniki to: olejek lawendowy, olejek kwiatu pomarańczy, karbomer (kwas poliakrylowy), makrogol 6 (Softigen 767), wersenian disodowy, trometamol, alkohol izopropylowy, woda oczyszczona.

### Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Reparil N Gel:

- w przypadku uczulenia na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,



- na otwarte rany, błony śluzowe, obszary skórne poddane promieniowaniu,
- w I trymestrze ciąży,
- w przypadku przewlekłej niewydolności nerek, chorobie nerek.

#### Działania niepożądane

- reakcje nadwrażliwości w miejscu stosowania (zaczerwienienie skóry, wysypka, rumień, zapalenie skóry, złuszczenie skóry, pokrzywka).

#### Ostrzeżenia

- Stosowanie żelu Reparil N na duże powierzchnie ciała może powodować wystąpienie działań ogólnych na organizm - związane z wpływem na wątrobę, nerki, układ pokarmowy oraz ogólnoustrojowych - astma, reakcje nadwrażliwości.
- Osoby z nadwrażliwością na salicylany nie powinny stosować żelu bez porozumienia z lekarzem.
- Podczas stosowania żelu, należy unikać kontaktu z oczami.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

#### Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.