

Scopolan 10 mg, 6 czopków

Cena: 14,96 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	SCOPOLAN
Opakowanie	6 czopków
Postać	Czopki
Producent	WROCŁAWSKIE ZAKŁ. ZIELARSKIE "HERBAPOL" S.A.
Przeznaczenie	Ból, Kamica dróg moczowych, Kolka, Skurcze
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 6 lat

Opis produktu

Opis

Scopolan w postaci czopków to lek dostępny bez recepty, który stosuje się w przypadku dolegliwości bólowych wynikających z występowania skurczów mięśni gładkich w obrębie jamy brzusznej. Każdy czopek zawiera 10 mg butylobromku hioscyny jako substancję czynną. Ta substancja działa rozkurczowo, co przyczynia się do złagodzenia bolesnych skurczów w przewodzie pokarmowym, dróg żółciowych i układzie moczowo-płciowym. Czopki Scopolan są przeznaczone do stosowania doraźnego, na przykład podczas bólu miesiączkowego, kolki jelitowej, kolki nerkowej, kolki żółciowej lub skurczów żołądka. Mogą być stosowane zarówno przez osoby dorosłe, jak i dzieci od 6. roku życia.

Wskazania

Produkt leczniczy Scopolan jest odpowiedni do stosowania w dolegliwościach bólowych w stanach skurczowych:

- przewodu pokarmowego np. skurcze żołądka, kolka jelitowa, zespół jelita drażliwego,
- dróg żółciowych np. kolka żółciowa,
- układu moczowo-płciowego np. bolesne miesiączkowanie, kolka nerkowa, stany skurczowe związane z kamicą moczowodową.

Działanie

Rozkurczowe na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego, dróg żółciowych i układu moczowo-płciowego.

Dawkowanie

- Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: doodbytniczo 1 do 2 czopków 2 do 3 razy na dobę.
- Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: doodbytniczo 1 czopek 2 do 3 razy na dobę.



Skład

1 czopek zawiera:

- substancję czynną: butylobromek hioscyny (Hyoscini butylbromidum) 10 mg,
- substancje pomocnicze: tłuszcz stały, polisorbata 80, parafina ciekła, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Scopolan:

- w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub substancje pomocnicze leku,
- w przypadku uczulenia na alkaloidy tropanowe (atropina i jej pochodne),
- jeśli pacjent choruje na: jaskrę z wąskim kątem przesączania, rozrost gruczołu krokowego, zaparcia atoniczne, niedrożność porażenną jelit, zwężenie

przełyku, wpustu lub odźwiernika żołądka, tachykardię, nużliwość mięśni,

Działania niepożądane

- zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: rumień, pieczenie skóry, świąd, wysypka, pokrzywka, obrzęk;
- zaburzenia żołądka i jelit: suchość w jamie ustnej, zaparcia;
- zaburzenia serca: tachykardia (przyspieszenie akcji serca);
- zaburzenia naczyniowe: hipotensja (niedociśnienie).

Ostrzeżenia

- W przypadku bólu brzucha (nagłego i o nieznanym przyczynie) i jednoczesnym występowaniu: gorączki, nudności, wymiotów, zmiany rytmu wypróżnień, tkliwość brzucha, zmniejszenie ciśnienia krwi, omdlenia, obecność krwi w kale - nie powinno stosować się leku bez konsultacji z lekarzem.
- Należy zachować ostrożność stosując lek w następujących schorzeniach: choroba refluksowa przełyku, wrzodziejące zapalenie jelit, choroby niedokrwiennej serca.
- Należy ostrożnie dawkować lek w przypadku osób starszych.
- Należy przerwać leczenie Scopolanem w przypadku wzrostu ciśnienia śródgałkowego lub zaburzonej ostrości widzenia.
- Lek zmniejsza wydzielanie potu.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Producent

Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.
ul. św. Mikołaja 65/68
50-951 Wrocław