

# Scopolan 10mg 10 tabletek

Cena: 13,11 zł



## Opis słownikowy

|                 |   |
|-----------------|---|
| Dla kogo        | Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn                             |
| Marka           | SCOPOLAN  |
| Opakowanie      | 10 drażetek   |
| Postać          | Drażetki  |
| Producent       | WROCLAWSKIE ZAKŁ. ZIELARSKIE "HERBAPOL" S.A.                      |
| Przeznaczenie   | Ból, Kamica dróg moczowych, Kolka, Menstruacja, Skurcze           |
| Rodzaj produktu | Lek bez recepty   |
| Wiek            | Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 6 lat |

## Opis produktu

### Opis

**Scopolan** to lek rozkurczowy w postaci tabletek drażowanych, który zawiera substancję czynną butylobromek hioscyny, znany również jako skopolamina. Ten składnik pomaga złagodzić bolesne skurcze mięśni gładkich w jamie brzusznej, takie jak skurcze przewodu pokarmowego, dróg żółciowych i układu moczowo-płciowego. Scopolan jest wskazany do stosowania w przypadku różnych dolegliwości bólowych spowodowanych skurczami mięśni gładkich, takimi jak bóle żołądka, kolki jelitowe, kolki żółciowe, kolki nerkowe, zespół jelita drażliwego oraz bolesne miesiączkowanie. Lek jest przeznaczony dla dorosłych, młodzieży i dzieci powyżej 6. roku życia.

### Wskazania

Doraźne stosowanie w dolegliwościach bólowych spowodowanych stanami skurczowymi:

- przewodu pokarmowego, w tym skurcze żołądka, kolka jelitowa, zespół jelita drażliwego,
- dróg żółciowych, w tym kolka żółciowa,
- układu moczowo-płciowego, w tym kolka nerkowa, stany skurczowe związane z kamicą moczowodową, bolesne miesiączkowanie.

### Działanie

Rozkurczowe.

### Dawkowanie

- Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 1-2 tabletki drażowane 3-5 razy na dobę.
- Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 1 tabletki drażowana 2 razy na dobę.

## Skład

1 tabletką drażowaną zawiera:

- substancję czynną: butylobromek hioscyny 10 mg,
- substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, laktoza jednowodna, guma arabska, sacharoza, talk, magnezu stearynian.

## Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Scopolan:

- nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych,
- w przypadku uczulenia na alkaloidy tropanowe (np. atropina) i ich pochodne,
- jeśli pacjent choruje na jaskrę z wąskim kątem przesączania, rozrost gruczołu krokowego, zaparcia atoniczne, niedrożność porażenną jelit, zwężenie

przełyku, wpustu lub odźwiernika żółtka, zwężenie szyi pęcherza moczowego, tachykardię, nużliwość mięśni, patologiczne poszerzenie jelita grubego,

- nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

## Działania niepożądane

- rumień, pieczenie skóry, świąd, wysypka, pokrzywka, obrzęk,
- suchość w jamie ustnej, zaparcia,
- tachykardia,
- hipotensja.

## Ostrzeżenia

- Scopolan zawiera laktozę jednowodną i sacharozę - nie stosować u pacjentów ze stwierdzoną nietolerancją cukrów (nietolerancja fruktozy, galaktozy, brak laktazy).
- Nie stosować w przypadku bólu brzucha o nieznanym przyczynie z towarzyszącą gorączką, nudnościami, wymiotami, zmianami rytmu wypróżnień, tkliwością brzucha, zmniejszeniem ciśnienia krwi, omdleniami, obecnością krwi w stolcu.
- Należy stosować ostrożnie w przypadku: choroby refluksowej przełyku, wrzodziejącego zapalenia jelit, choroby niedokrwiennej serca.
- Należy przerwać stosowanie produktu w przypadku wzrostu ciśnienia gałkowego lub zaburzeń ostrości widzenia.
- Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

## Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

## Producent

Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.  
ul. Św. Mikołaja 65/68  
50-951 Wrocław