

Sinupret ,100 tabl. IR

Cena: 87,62 zł



Opis słownikowy

Część ciała	Nos, Zatoki
Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	SINUPRET
Opakowanie	100 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	INPHARM SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Katar, Zapalenie, Zatoki
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 6 lat

Opis produktu

Opis

Sinupret to produkt leczniczy pochodzenia roślinnego, który jest stosowany do wspomagania leczenia ostrych i przewlekłych stanów zapalnych zatok u dzieci powyżej 6 roku życia oraz u dorosłych. Preparat działa sekretolitycznie, co oznacza, że pomaga w rozrzedzeniu śluzu, co prowadzi do zmniejszenia obrzęku błon śluzowych górnych dróg oddechowych. Dzięki temu może pomóc w łagodzeniu objawów związanych z zapaleniem zatok, takich jak katar, zatkanie nosa czy uczucie ciężkości w okolicach twarzy.

Wskazania

Wspomagająco w ostrych i przewlekłych stanach zapalnych zatok.

Działanie

Rozrzedza śluz, dając efekt zmniejszający obrzęk błon śluzowych górnych dróg oddechowych.

Dawkowanie

- Dorośli: 3 razy na dobę po 2 tabletki drażowane.
- Dzieci w wieku szkolnym (od 6 lat): 3 razy po 1 tabletkę drażowaną.

Skład

1 tabletka drażowa leku Sinupret zawiera:

- substancje czynne: korzeń goryczki 6 mg, kwiat pierwiosnka z kielichem 18,000 mg, ziele szczawiu 18 mg, kwiat bzu czarnego 18 mg, ziele werbeny 18 mg,
- substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, krzemionka bezwodna koloidalna, woda oczyszczona, laktoza jednowodna,

żelatyna, sorbitol, kwas stearynowy; składniki otoczki: wapnia węglan, syrop glukozowy (suchy), lakier zielony (żółcień chinolinowa E 104, indygotyna E 132), lakier żółto-zielony (żółcień chinolinowa E 104, indygotyna E 132), magnezu tlenek lekki, skrobia kukurydziana, skrobia kukurydziana modyfikowana, wosk montanoglikolowy, sodu węglan bezwodny, kopolimer 2-dimetyloaminoetylometakrylanu, butylometakrylanu, metylometakrylanu, powidon K 25, olej rycynowy z pierwszego tłoczenia, rafinowany, sacharoza, szelak, talk, tytanu dwutlenek.

Przeciwwskazania

Jeśli występuje nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku, jego stosowanie jest przeciwwskazane. Dodatkowo, nie zaleca się stosowania tego leku u dzieci w wieku poniżej 6 lat ze względu na brak odpowiednich badań dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności u tej grupy wiekowej.

Działania niepożądane

- zaburzenia żołądka i jelit np. ból brzucha, nudności,
- miejscowe reakcje nadwrażliwości - osutka, rumień, świąd
- poważne reakcje alergiczne takie jak obrzęk warg, języka i gardła

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ostrzeżenia

- W przypadku wystąpienia alergicznych reakcji skórnych należy przerwać stosowanie produktu i skonsultować się z lekarzem.
- Jeżeli objawy trwają dłużej niż 7-14 dni lub nawracają okresowo, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.