

Sir. Plantaginis 125 g



Cena: 9,87 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	HASCO-LEK
Opakowanie	125 g
Postać	Syrop
Producent	PRZEDS. PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Przeznaczenie	Ból gardła, Kaszel, Przeziębienie i grypa
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Od 6 lat

Opis produktu

Opis

Syrop z babki lancetowatej stosuje się w podrażnieniach i łagodnych stanach zapalnych jamy ustnej i gardła z objawami kaszlu. Środek tradycyjnie stosowany w nieżytach górnych dróg oddechowych. Pomocniczo w grypie jako środek osłaniający błony śluzowe gardła.

Wskazania

Nieżytach górnych dróg oddechowych i przeziębieniu, pomocniczo w zapaleniu gardła.

Działanie

Syrop Syrop Alcep® wykazuje działanie wykrztuśne i rozkurczowe na mięśnie gładkie górnych dróg oddechowych. Dzięki temu może pomóc w rozrzedzeniu i usunięciu śluzu oraz ułatwić oddychanie w przypadku łagodnych infekcji górnych dróg oddechowych, takich jak przeziębienie i katar.

Dodatkowo, syrop Alcep® wykazuje działanie przeciwzapalne w obrębie błon śluzowych jamy ustnej i gardła. Działanie przeciwzapalne może pomóc w zmniejszeniu obrzęku i zaczerwienienia błon śluzowych oraz w łagodzeniu podrażnień i dyskomfortu w gardle.

Dawkowanie

- dzieci w wieku od 6. do 12. lat: 5ml syropu 3-4 razy na dobę,
- dorośli i dzieci powyżej 12. lat: 15ml syropu 3-4 razy na dobę.

Skład

100g syropu zawiera: substancję czynną wyciąg płynny z babki lancetowatej 10g; ekstrahent etanol 60% (v/v) i substancje pomocnicze: sacharoza, aoda oczyszczona, aromat malinowy.

Przeciwwskazania



- Osoby wykazujące nadwrażliwość na jakikolwiek składnik leku nie powinny go stosować. Nadwrażliwość może prowadzić do reakcji alergicznych lub działań niepożądanych.
- Lek Alcep® nie jest odpowiedni dla osób cierpiących na alkoholizm, ponieważ może zawierać alkohol jako substancję pomocniczą, co może negatywnie wpływać na osoby z tym schorzeniem.
- Ze względu na brak odpowiednich danych dotyczących bezpieczeństwa, nie zaleca się podawania leku kobietom w ciąży i karmiącym piersią.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.