

Smecta 3 g, smak pomarańczowo-waniliowy, 30 saszetek

Cena: 29,94 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	SMECTA
Opakowanie	30 saszetek
Postać	Proszek
Producent	IPSEN CONSUMER HEALTHCARE
Przeznaczenie	Biegunka
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 2 lat

Opis produktu

Opis

Smecta to lek przeciwbiegunkowy przeznaczony do stosowania u dorosłych i dzieci powyżej 2. roku życia. Jego substancją czynną jest diosmektyt, który jest glinokrzemianem. Smecta działa poprzez tworzenie ochronnej warstwy na błonie śluzowej przewodu pokarmowego, co wzmacnia jej barierę ochronną przed drażniącymi czynnikami oraz patogenami.

Ten lek jest używany w leczeniu ostrej biegunki, zarówno u dzieci, jak i dorosłych, zazwyczaj w połączeniu z nawadnianiem płynami. Ponadto, Smecta jest stosowana w leczeniu objawowym przewlekłej biegunki czynnościowej u dorosłych.

Wskazania

Lek Smecta 3 g stosuje się u dzieci powyżej 2 roku życia:

- w leczeniu ostrej biegunki.

Lek Smecta 3 g stosuje się u dorosłych:

- w leczeniu ostrej biegunki,
- w leczeniu objawowym przewlekłej biegunki czynnościowej.

Działanie

Przeciwbiegunkowe, powlekające na błonę śluzową przewodu pokarmowego, działa ochronnie na śluzówkę poprzez izolowanie jej od działania kwasu solnego i innych substancji drażniących.

Dawkowanie

- Dzieci w wieku powyżej 2 lat: 2 saszetki na dobę.
- Dorośli: zazwyczaj stosuje się 3 saszetki na dobę.



Skład

1 saszetka zawiera:

- substancję czynną: diosmektyt 3 g,
- substancje pomocnicze: glukoza jednowodna, sacharynian sodu, aromat waniliowy, aromat pomarańczowy.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Smecta:

- jeśli pacjent ma uczulenie na diosmektyt lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Działania niepożądane

- Zaparcia,
- Wysypka,

Ostrzeżenia

- Nie stosować leku w przypadku nietolerancji niektórych cukrów oraz gdy w przeszłości występowały ciężkie zaparcia; lek zawiera glukozę i sacharozę.
- Należy skonsultować się z lekarzem jeśli nie nastąpi poprawa w ciągu 3 dni w przypadku biegunki ostrej.
- Podczas leczenia biegunki ważne jest odpowiednia nawodnienie, obejmujące m.in. dużą ilość słonych lub słodkich napojów (zapotrzebowanie na wodę u dorosłych wynosi 2 litry). Podczas biegunki należy powstrzymać się od przyjmowania pokarmów do momentu ustąpienia biegunki (należy wykluczyć surowe owoce i warzywa, pikantne dania, mrożone dania).
- Nie zaleca się długotrwałego i częstego stosowania leku Smecta bez konsultacji z lekarzem.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Producent

IPSEN Consumer HealthCare
65 Quai Georges Gorse
92100 Boulogne Billancourt
Francja