

Soledum forte Kapsułki dojelitowe 20 sztuk

Cena: 27,63 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	SOLEDUM
Opakowanie	20 kapsułek
Postać	Kapsułka
Producent	M.C.M. KLOSTERFRAU HEALTHCARE SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Kaszel, Kaszel mokry, Zatoki
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Od 12 lat

Opis produktu

Opis

Lek Soledum forte jest stosowany jako środek wykrztusny w leczeniu kaszlu produktywnego, który jest nazywany również mokrym kaszlem. Działa poprzez wspomaganie odkrztuszania zalegającej wydzieliny w drogach oddechowych, co pomaga oczyścić płuca i ułatwia oddychanie.

Wskazania

Leczenie produktywnego kaszlu i leczenie wspomagające ostrego, nieropnego zapalenia zatok.

Działanie

Lek Soledum forte działa wykrztusnie, upłynnia wydzielinę z dróg oddechowych, wspomaga ostre, nieropne zapalenie zatok.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 1 kapsułka 3 razy na dobę. W kontynuacji terapii lub długotrwałym leczeniu dawka 2 razy na dobę jest zazwyczaj wystarczająca.

Skład

1 kapsułka zawiera:

- substancję czynną: cyneol (Cineolium) 200 mg,
- substancje pomocnicze: triglicerydy kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, żelatyna, sorbitol ciekły, niekryształizujący, glicerol 85%, woda oczyszczona, zawiesina Surelease - Nutrateric (etyloceluloza, triglicerydy kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, kwas oleinowy, amonowy wodorotlenek stężony, woda oczyszczona), NS Enteric - Nutrateric (sodu alginian, kwas stearynowy), wosk Candelilla.

Przeciwwskazania

- Uczulenie na cyneol lub na którykolwiek z pozostałych składników leku może prowadzić do reakcji alergicznych lub działań niepożądanych, dlatego osoby z taką nadwrażliwością nie powinny stosować tego preparatu.
- Soledum forte nie jest odpowiedni do stosowania w przypadku krztuśca lub pseudo-krztuśca, ponieważ to są specyficzne schorzenia, które wymagają innej terapii i opieki medycznej.
- Lek nie powinien być stosowany u dzieci w wieku poniżej 12 lat ze względu na brak odpowiednich badań i danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności u tej grupy wiekowej.

Działania niepożądane

- Zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, biegunka)
- Reakcje nadwrażliwości (obrzęk twarzy, świąd, zaburzenia oddychania, kaszel) i trudności w połykaniu.

Ostrzeżenia

- Jeśli pacjent ma chorobę związaną ze znaczną nadwrażliwością dróg oddechowych, może to wpłynąć na odpowiedni dobór terapii, dlatego ważne jest skonsultowanie się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku.
- Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż tydzień, występuje duszność, gorączka lub ropne albo krwawe odkrztuszanie, pacjent powinien natychmiast skonsultować się z lekarzem, ponieważ te objawy mogą wskazywać na poważniejsze schorzenia i wymagać bardziej intensywnego leczenia.
- W przypadku ciąży i karmienia piersią, pacjentka powinna zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku Soledum forte. Brak dostępnych danych dotyczących stosowania leku w czasie ciąży wymaga indywidualnej oceny przez lekarza.
- Co do karmienia piersią, choć 1,8-cyneol przenika do mleka matki, dotychczasowe dane nie wskazują na zauważalne problemy u niemowląt karmionych piersią matki przyjmujących 1,8-cyneol.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Galeria





APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943