

Starazolin krople do oczu 0,5 mg/ml 5 ml x 2



Cena: 21,04 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	STARAZOLIN
Opakowanie	10 ml (2 sztuki po 5 ml)
Postać	Krople do oczu
Producent	WARSZAWSKIE ZAKŁ. FARM. POLFA S.A.
Przeznaczenie	Łagodzące (kojące), Ochronne, Przeciwozbrzękowe
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Starazolin to lek przeznaczony dla dorosłych i dzieci powyżej 2. roku życia, stosowany w celu objawowego leczenia stanów, które charakteryzują się obrzękiem i przekrwieniem spojówek, wywołanym czynnikami drażniącymi, takimi jak kurz, dym, soczewki kontaktowe, wiatr, jaskrawe światło, chlorowana woda oraz kosmetyki. Preparat może być również używany w przypadku alergicznych stanów zapalnych, takich jak katar sienny oraz uczulenie na pyłki traw. Starazolin łagodzi dolegliwości, takie jak pieczenie, świąd, bolesność, nadmierne łzawienie i podrażnienie.

Wskazania

Obrzęk i przekrwienie spojówek, a także alergiczne stany zapalne, takie jak: katar sienny i uczulenie na pyłki traw, zmęczenie oczu.

Działanie

Zmniejszenie przekrwienia i obrzęku spojówek, łagodzenie pieczenia, świądu, bolesności, nadmiernego łzawienia i podrażnienia.

Dawkowanie

Dzieci powyżej 2 lat, młodzież i dorośli: 1-2 krople, 2-3 razy na dobę.

Skład

1 ml zawiera:

- substancję czynną: chlorowoderek tetryzolinu 0,5 mg,
- substancje pomocnicze: sodu chlorek, edetynian disodu, benzalkoniowy chlorek, sodu tetraboran, kwas borowy, woda wysokooczyszczona.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Starazolin:

- w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną - tetryzolinę chlorowoderek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- u osób ze stwierdzoną jaskrą, szczególnie z wąskim kątem przesączania lub w innych ciężkich schorzeniach oczu,
- u osób poniżej 2 lat,
- u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią.

Działania niepożądane

Często występujące działania niepożądane :

- działania ogólnoustrojowe - bóle głowy, kołatanie serca, osłabienie, nadmierna potliwość, podwyższenie ciśnienia tętniczego, drżenia,
- reaktywne przekrwienie, pieczenie błon śluzowych, suchość błon śluzowych.

Ostrzeżenia

- W przypadku nasilenia się objawów stanu zapalnego należy skonsultować się z lekarzem.
- Leku nie zaleca się stosować w infekcjach, uszkodzeniu rogówki, w nasilonym bólu.
- W przypadku braku poprawy po 2-dniowym stosowaniu Starazolin, należy skonsultować się z lekarzem.
- Lek stosować ostrożnie w przypadku stwierdzonych ciężkich chorób układu krążenia (choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze), guza chromochłonnego nadnerczy, cukrzycy, nadczynności tarczycy.
- Lek stosować ostrożnie, jeśli pacjent przyjmuje inhibitory MAO lub inne leki, które mogą podnosić ciśnienie krwi.
- Lek zawiera chlorek benzalkoniowy, może on powodować podrażnienie oczu. Należy unikać kontaktu z soczewkami kontaktowymi. Zaleca się 15-minutowy odstęp czasu między aplikacją kropli i ponownym założeniem soczewek.
- Natychmiast skontaktować się z lekarzem jeśli wystąpią: silny ból oka, ból głowy, zanik widzenia.
- Lek ten nie jest skuteczny w przypadku reakcji alergicznych typu późnego - zapalenie kontaktowe spojówek i skóry powiek.
- Po pierwszym otwarciu butelki, lek należy zużyć w ciągu 28 dni.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Producent

POLFA WARSZAWA
Karolkowa 22/24
Warszawa

Galeria

The gallery consists of four promotional cards for Starazolin eye drops. The first card shows the product packaging: a box and two 5ml bottles. The second card lists key benefits: fast relief for red eyes, two bottles per package, and quick action. The third card lists symptoms it treats: eye redness, eye pain, eye itching, and swollen/red conjunctivae. The fourth card features a large number '1' in a ribbon, indicating it is the most frequently chosen brand by consumers.

Starazolin®

NA CZERWONE OCZY

Starazolin®

SZYBKA POMOC DLA ZACZERWIENIONYCH OCZU*

2 BUTELECZKI W OPAKOWANIU

SZYBKOŚĆ DZIAŁANIA – MIEJSCOWE ZASTOSOWANIE LEKU NA SPOJÓWKĘ PROWADZI W CIĄGU KILKU MINUT DO ZWĘŻENIA NACZYŃ*

Starazolin®

DO STOSOWANIA PRZY OBJAWACH TAKICH JAK M. IN.:

zaczerwienienie oczu

piekące oczy

nadmierne łzawienie oczu

opuchnięte i czerwone spojówki

Starazolin®

MARKA STARAZOLIN® NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA PRZEZ KONSUMENTÓW*

1

* Opatk. Rynek 07A2, Sell Out, YTD II.2021

STU/2201/04-2023