

Strepsils Intensive Tabletki do ssania 16 sztuk

Cena: 27,54 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	16 tabl. (2 blist. po 8 tabl.)
Postać	tabl.do ssania
Producent	RECKITT BENCKISER POLAND S.A.

Opis produktu

Składniki

Jedna tabletki do ssania zawiera 8,75 mg flurbiprofenu oraz syrop sacharozowy, syrop glukozowy, makrogol 300, potasu wodorotlenek, aromat cytrynowy, lewomentol, miód

Stosowanie

Podanie doustne.

Dawkowanie i sposób stosowania: Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: Jedną tabletkę do ssania co 3 do 6 godzin w razie potrzeby. Tabletki należy ssać powoli. Nie stosować więcej niż 5 tabletek do ssania w ciągu doby. W czasie ssania położenie tabletki w ustach należy zmieniać, by uniknąć miejscowego podrażnienia. Jeśli po 3 dniach objawy bólu nie przemijają lub nasilają się, a także jeśli wystąpią nowe objawy, należy zasięgnąć porady lekarza. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed wilgocią.

Przeciwwskazania

Ostrzeżenia: Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem w przypadku:

- astmy oskrzelowej, zaburzeń czynności wątroby, choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy, niewydolności nerek, chorób serca, nadciśnienia tętniczego lub zaburzeń krzepnięcia krwi;
- przyjmowania innych leków przeciwbólowych, zawierających kwas acetylosalicylowy lub innych NLPZ;
- ciąży lub karmienia piersią;
- cukrzycy (każda tabletki do ssania zawiera 2,5 g węglowodanów, co odpowiada około 0,25 jednostki chlebowej).

Nie należy stosować dawki większej niż zalecana.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Producent

Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

Opis

Strepsils Intensive Tabletki do ssania 16 sztuk

Galeria

