

# Sudafed Xylospray HA Aerozol do nosa 10 ml



Cena: 29,77 zł

## Opis słownikowy

Część ciała	Nos
Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	SUDAFED
Opakowanie	10 ml
Postać	Aerozol
Producent	MCNEIL HEALTHCARE (IRELAND) LTD.
Przeznaczenie	Alergia, Katar, Uczulenie
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 6 lat

## Opis produktu

### Opis

**Sudafed XyloSpray HA** to lek obkurczający naczynia krwionośne, co powoduje zmniejszenie obrzęku błony śluzowej nosa. Jego działanie zwykle występuje w ciągu 5-10 minut od podania, co przyczynia się do ulgi w objawach. Dzięki zmniejszeniu obrzęku, ułatwiony zostaje odpływ wydzieliny, co w efekcie ułatwia oddychanie.

Ważnym składnikiem tego leku jest kwas hialuronowy w postaci soli sodowej, który chroni i nawilża błonę śluzową nosa. Obecność tego składnika jest korzystna dla komfortu pacjenta i może pomóc w utrzymaniu odpowiedniego nawilżenia błony śluzowej.

Sudafed XyloSpray HA jest dostępny w postaci sprayu, co ułatwia jego stosowanie zarówno u dorosłych, jak i u dzieci powyżej 6 lat. Jego przyjazny skład, pozbawiony konserwantów, zmniejsza ryzyko podrażnienia błony śluzowej nosa.

### Wskazania

- Lek stosuje się przy nadmiernym przekrwieniu błony śluzowej (występującym przy przeziębieniu, grypie, katarze siennym oraz w alergicznym nieżycie nosa).
- W zapaleniu zatok przynosowych oraz w zapaleniu trąbki słuchowej ucha środkowego połączonego z przeziębieniem.

### Działanie

Obkurczenie naczyń krwionośnych i zmniejszenie obrzęku błony śluzowej nosa.

### Dawkowanie

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat: stosuje się jedną dawkę do każdego otworu nosowego 3 razy na dobę.

### Skład

1 ml roztworu zawiera

- substancję czynną: ksylometazoliny chlorowodorek 1 mg,
- pozostałe składniki: sodu hialuronian, sorbitol, glicerol, sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwuwodny, sodu chlorek, woda do wstrzykiwań.

### Przeciwwskazania

Sudafed XyloSpray HA nie powinien być stosowany w następujących przypadkach:

- U pacjentów z nadwrażliwością na którykolwiek składnik preparatu, ponieważ może to spowodować wystąpienie działań niepożądanych lub reakcji alergicznych.
- U pacjentów z suchym zanikowym zapaleniem błony śluzowej nosa, ponieważ preparat działa obkurczająco na naczynia krwionośne i może zaostrzyć objawy tego schorzenia.
- Nie powinien być stosowany u dzieci poniżej 6 roku życia, ze względu na brak ustalonych bezpieczeństwa i skuteczności u tej grupy wiekowej.
- Nie powinien być stosowany u pacjentów po usunięciu przysadki mózgowej lub po innych zabiegach chirurgicznych przebiegających z odsłonięciem opony twardej, aby uniknąć ewentualnych komplikacji.

### Działania niepożądane

- objawy podrażnienia (pieczenie lub suchość błony śluzowej nosa),
- kichanie, zwłaszcza u pacjentów wrażliwych,
- po odstawieniu leku może dochodzić do nasilenia obrzęku błony śluzowej (przekrwienia reaktywnego).

### Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

### Ostrzeżenia

- Lek nie zawiera środków konserwujących.
- Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki wynosi 12 miesięcy.

### Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.