

Supremin 4 mg/5 ml Lek o działaniu przeciwkaszlowym syrop 200 ml



Cena: 22,63 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	SUPREMIN
Opakowanie	1 butelka 200ml
Postać	Syrop
Producent	TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
Przeznaczenie	Kaszel, Kaszel suchy
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 2 lat

Opis produktu

Opis

Supremin to lek przeciwkaszlowy stosowany w przypadku ostrego, suchego kaszlu. Może być podawany zarówno dorosłym, jak i dzieciom powyżej 2 roku życia. Substancją aktywną tego leku jest butamiratu cytrynian, który działa jako środek przeciwkaszlowy. Butamiratu cytrynian działa na dwa sposoby: po pierwsze, hamuje odruch kaszlu w ośrodkowym układzie nerwowym, co prowadzi do zmniejszenia częstotliwości i nasilenia kaszlu. Po drugie, wykazuje działanie cholinolityczne na poziomie obwodowym, co skutkuje nieznacznym rozszerzeniem oskrzeli, co może ułatwić oddychanie.

Wskazania

Suchy, ostry kaszel.

Działanie

Przeciwkaszlowe, rozkurczające mięśniówkę oskrzeli, ułatwiające oddychanie.

Dawkowanie

- Dzieci w wieku od 2 do 6 lat: 4 mg (1 łyżeczka miarowa) 3 razy na dobę
- Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 8 mg (2 łyżeczki miarowe) 3 razy na dobę
- Dzieci w wieku powyżej 12 lat: 12 mg (3 łyżeczki miarowe) 3 razy na dobę
- Dorośli: 12 mg (3 łyżeczki miarowe) 4 razy na dobę.

Skład

5 ml syropu (1 łyżeczka) zawiera:

- substancję czynną: cytrynianu butamiratu 4 mg,
- substancje pomocnicze: metylu parahydroksybenzoian, kwas benzoianowy, kwas cytrynowy bezwodny, sodu cytrynian, maltitol ciekły, aspartam, aromat karmelowo-pomarańczowy (E 34493), woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

- W przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- Jeśli pacjent cierpi na fenyloketonurię.

Działania niepożądane

- Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: wysypka,
- Zaburzenia żołądka i jelit: nudności, biegunka,
- Zaburzenia układu nerwowego: zawroty głowy.

Ostrzeżenia

- Jeśli działania niepożądane (zaburzenia żołądkowo-jelitowe, reakcje alergiczne) nie ustępują po zmniejszeniu dawki, stosowanie leku należy przerwać.
- Leku Supremein nie należy stosować u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami ośrodkowego układu oddechowego.
- Lek zawiera aspartam, który jest źródłem fenyloalaniny. Lek nie powinien być stosowany u chorych z fenyloketonurią.
- Lek zawiera kwas benzoianowy i parahydroksybenzoian metylu - substancje mogące powodować reakcje alergiczne, również typu późnego.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Producent

POLFARMEX
Józefów 9
Kutno

Galeria

