

Supremin Max 15 mg/ml Lek o działaniu przeciwkaszlowym syrop 150 ml



Cena: 35,70 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	SUPREMIN
Opakowanie	1 butelka 150ml
Postać	Syrop
Producent	TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
Przeznaczenie	Łagodzące (kojące), Przeciwkaszlowe
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 3 lat

Opis produktu

Opis

Supremin MAX to nieopiodowy syrop przeciwkaszlowy o klarownej konsystencji i pomarańczowym smaku oraz aromacie. Produkt ten jest przeznaczony do stosowania u dzieci powyżej 3. roku życia, młodzieży oraz dorosłych w celu objawowego leczenia ostrego, suchego kaszlu. Jego substancją czynną jest butamirat cytrynian, który działa poprzez hamowanie odruchu kaszlowego. Syrop Supremin Max jest dostępny w opakowaniu zawierającym 150 ml produktu. Aby ułatwić dawkowanie, w opakowaniu znajduje się dołączona miarka dozująca z czytelną podziałką.

Wskazania

Objawowe leczenie ostrego, suchego kaszlu.

Działanie

Przeciwkaszlowe.

Dawkowanie

- Dzieci w wieku od 3 do 6 lat: 5 ml syropu trzy razy na dobę.
- Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 10 ml syropu trzy razy na dobę.
- Młodzież w wieku powyżej 12 lat: 15 ml syropu trzy razy na dobę.
- Dorośli: 15 ml syropu cztery razy na dobę.

Skład

1 ml syropu zawiera:

- substancję czynną: 1,5 mg butamiratu cytrynianu,
- substancje pomocnicze: sodu benzoesan (E 211), sorbitol ciekły, niekrystalizujący (E 420), glicerol, sacharyna sodowa (E 954), aromat pomarańczowy płynny (zawiera etanol), kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Supremin MAX:

- w przypadku nadwrażliwości (uczulenia) na substancję czynną - cytrynian butamiratu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeśli pacjent ma objawy ciężkiego zahamowania czynności ośrodka oddechowego,
- u kobiet w I trymestrze ciąży.

Działania niepożądane

Rzadko występujące działania niepożądane: nudności, biegunka, pokrzywka, zawroty głowy, senność.

Ostrzeżenia

- Lek zawiera sorbitol - stosowanie tego leku omówić z lekarzem w przypadku stwierdzonej nietolerancji niektórych cukrów.
- Ze względu na zawartość sorbitolu, lek może mieć łagodne działanie przeczyszczające.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
- Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Producent

POLFARMEX
Józefów 9
Kutno

Galeria

