

# Tadalafil Maxon 10 mg, 2 tabletki powlekane

Cena: 34,94 zł



## Opis słownikowy

Dla kogo	Dla mężczyzn
Marka	MAXON
Opakowanie	2 tabletki
Postać	Tabletka
Producent	ADAMED PHARMA S.A.
Przeznaczenie	Wspomagające sprawność seksualną, Wzmacniające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

## Opis produktu

### Opis

**Tadalafil Maxon 10 mg** to lek dostępny w postaci podłużnych tabletek powlekanych o jasnopomarańczowej barwie, stworzony specjalnie dla mężczyzn cierpiących na zaburzenia erekcji. Zaburzenie to objawia się trudnością w uzyskaniu lub utrzymaniu wystarczająco silnej erekcji prącia, by umożliwić odbycie stosunku płciowego.

### Wskazania

Leczenie zaburzeń wzdrodu u dorosłych mężczyzn (impotencji).

### Działanie

Wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu, zwiększając napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego.

### Dawkowanie

Zalecana dawka: 1 tabletkę 10 mg, połknąć w całości i popić niewielką ilością wody. Zażyć przynajmniej 30 minut przyjmowana przed aktywnością seksualną. Lek może być skuteczny do 36 godzin po przyjęciu tabletki.

### Skład

Substancją czynną jest Tadalafilum.

Każda tabletkę zawiera 10 mg tadalafilu (Tadalafilum).

Substancje pomocnicze: Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, powidon K 30, poloksamer typ 188, sodu laurylosiarczan, kroscarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian. Otoczka tabletki: alkohol poliwinylowy, makrogol 3350, talk, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172).

### Przeciwwskazania

- Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego.

- Stosowanie jest przeciwwskazane u pacjentów: z ciężkimi chorobami serca, z niestabilną dławicą piersiową; u których w ciągu ostatnich 6 miesięcy występowała niewydolność serca co najmniej 2 stopnia według klasyfikacji NYHA, z niekontrolowanymi arytmiami, niedociśnieniem (<90/50 mm Hg) lub niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym; którzy w ciągu ostatnich 6 miesięcy przeżyli udar.

#### Działania niepożądane

- Często - ból głowy, ból pleców, ból mięśni, ból rąk i nóg, zaczerwienienie twarzy, przekrwienie błony śluzowej nosa i niestrawność.
- Niezbyt często - zawroty głowy, ból brzucha, nudności, wymioty, zarzucanie treści żołądkowej do przełyku niewyraźne widzenie, ból oczu, trudności w oddychaniu, obecność krwi w moczu, przedłużony czas trwania wzwodu, uczucie kołatania serca, szybkie bicie serca, wysokie ciśnienie krwi, niskie ciśnienie krwi, krwawienie z nosa, dzwonięcie w uszach, obrzęk rąk, stóp lub kostek i uczucie zmęczenia.
- Rzadko - omdlenia, drgawki i przemijająca utrata pamięci, obrzęk powiek, zaczerwienienie oczu, nagłe pogorszenie lub utrata słuchu, pokrzywka (swędzące, czerwone uwypuklenia na powierzchni skóry), krwawienie z prącia, obecność krwi w nasieniu i zwiększona potliwość.

#### Ostrzeżenia

- Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Tadalafil Maxon należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli u pacjenta występuje: niedokrwistość sierpowatokrwinkowa (nieprawidłowy kształt czerwonych krwinek); szpiczak mnogi (nowotwór szpiku kostnego); białaczka (nowotwór komórek krwi); jakiegokolwiek zniekształcenie członka; ciężkie choroby wątroby; ciężkie choroby nerek.
- Jeśli wystąpi nagłe pogorszenie widzenia lub nagła utrata wzroku, należy przerwać stosowanie leku Tadalafil Maxon i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
- Leku Tadalafil Maxon nie należy przyjmować, jeśli nie stwierdzono zaburzeń erekcji.
- Tadalafil Maxon nie jest przeznaczony dla kobiet.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

#### Producent

Adamed Pharma S.A.  
Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A  
05-152 Czosnów