

Tantum Verde Forte aerozol 15 ml



Cena: 28,75 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	TANTUM VERDE
Opakowanie	15 ml
Postać	Aerozol
Producent	AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. SPA
Przeznaczenie	Dezynfekujące (odkażające), Przeciwbólowe, Przeciwzapalne, Znieczulające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Tantum Verde Forte 3 mg/ml to lek przeciwzapalny i znieczulający w postaci aerozolu o słodko-miętowym smaku przeznaczony do stosowania w jamie ustnej i gardle. Jest dostępny w wygodnym i precyzyjnym aplikatorze, który umożliwia dokładne dawkowanie mgiełki leku.

Wskazania

Lek Tantum Verde Forte 3 mg/ml stosuje się w:

- leczeniu objawów związanych ze stanem zapalnym jamy ustnej i gardła tj. w zakażeniach bakteryjnych i wirusowych, zapaleniu krtani, zapaleniu błon śluzowych po radioterapii,
- stanach po zabiegach operacyjnych w laryngologii, stomatologii oraz po intubacji.

Działanie

Miejscowo przeciwzapalne, przeciwbólowe, znieczulające, antyseptyczne.

Dawkowanie

Dorośli: stosować od 2 do 6 razy na dobę, po 2-4 dawki.

Skład

1 ml aerozolu zawiera:

- substancja czynna: 0,3 g chlorowodoru benzydaminu,
- substancje pomocnicze: glicerol, etanol 96%, olej rycynowy uwodniony, sacharyna sodowa, metylu parahydroksybenzoesan,



kompozycja smakowo-zapachowa miętowa, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Tantum Verde Forte:

- w przypadku uczulenia na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Działania niepożądane

- Niezbyt często występujące działania niepożądane: uszkodzenie skóry w wyniku nadwrażliwości na światło (odczyny fototoksyczne).
- Rzadko występujące działania niepożądane: pieczenie lub suchość w jamie ustnej.
- Bardzo rzadko występujące działania niepożądane: skurcz krtani, obrzęk naczynioruchowy.

Ostrzeżenia

- Długotrwałe stosowanie może wiązać się z wystąpieniem reakcji uczuleniowej.
- Lek zawiera parahydroksybenzoesan metylu, który może powodować reakcje alergiczne, również typu późnego.
- Lek zawiera olej rycynowy uwodorniony, który może powodować reakcje skórne.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

AZIENDE CH.ANGELINI