

Tiorfan kaps.twarde 0,1 g 10 kapsułek

Cena: 41,89 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	10 kapsułek
Postać	Kapsułki
Producent	BIOPROJET EUROPE LTD.
Przeznaczenie	Biegunka
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Tiorfan 100 mg to produkt leczniczy w postaci kapsułek twardej, które dzielą po 100 mg racekadotrylu (Racecadotrilum). Kapsułki mają kolor kości słoniowej i udostępniają biały protokół o dostawcy. Racekadotryl jest substancją czynną stosowaną w kanale biegunowym, szczególnie tych o charakterze charakterystycznym. Działa poprzez hamowanie enzymu neprylisyny, współpowodując zahamowanie biegunka i stanu pacjenta. Produkt ten jest dostępny na rynku jako lek na receptę i powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza.

Wskazania

Lek Tiorfan 100 mg kapsułki stosuje się u osób dorosłych:

- w leczeniu objawowym ostrej biegunki u dorosłych, gdy nie jest możliwe leczenie przyczynowe,
- jako leczenie wspomagające, gdy może być zastosowane leczenie przyczynowe.

Działanie

Lek Tiorfan ma działanie przeciwbiegunkowe.

Dawkowanie

Dawkowanie: 1 kapsułka 3 razy dziennie.

Skład

1 kapsułka zawiera:

- substancję czynną: racekadotryl 100 mg,
- substancje pomocnicze (proszek): laktoza, skrobia żelowana kukurydziana, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna,
- substancje pomocnicze (otoczka kapsułki): żelatyna, żelaza tlenek żółty (E172), tytanu dwutlenek (E171).



Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Tiorfan:

- w przypadku pacjentów uczulonych na racekadotryl lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Działania niepożądane

- bóle głowy.
- wysypka i rumień (zaczerwienienie skóry).
- rumień wielopostaciowy (różowe zmiany na skórze kończyn i wewnątrz jamy ustnej),
- obrzęk języka, twarzy, ust, powiek,

Ostrzeżenia

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą jeśli:

- występuje gorączka oraz krew lub ropa w stolcu,
- biegunka jest przewlekła albo spowodowana stosowaniem antybiotyków,
- występują zaburzenia czynności nerek albo wątroby,
- pojawiają się przedłużająca albo niekontrolowane wymioty.