

Traumon żel 100 g



Cena: 43,84 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	100 g
Postać	Żel
Producent	MYLAN HEALTHCARE SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwozrękowe, Przeciwzapalne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Żel leczniczy **Traumon** zawiera jedną czynną substancję, tj. etofenamát, w stężeniu 100 mg/g żelu. Jest to produkt o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym, przeznaczony do stosowania miejscowego na skórze.

Wskazania

- Lek o właściwościach przeciwbólowych działający przeciwzapalne na układ mięśniowo-kostny.
- Żel odpowiedni do stosowania miejscowego u dorosłych.

Działanie

Przeciwzapalne, przeciwbólowe oraz przeciwobrzękowe.

Dawkowanie

Żel Traumon nakłada się w postaci paska długości około 5 - 10 cm na bolące miejsce. Żel wciera się w bolące miejsce do momentu wchłonięcia. Czynność powtarza się 3 do 4 razy na dobę.

Skład

1 g żelu zawiera:

- substancję czynną: etofenamát (Etofenamat) 100 mg.
- substancje pomocnicze: karbomer, eter makrogolu oleinocetylowy (Emulgin M8 Deo), sodu wodorotlenek, alkohol izopropylowy, makrogol 400, glikol propylenowy, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Traumon:

- w przypadku uczulenia (nadwrażliwości) na etofenamát, kwas flufenamowy, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne lub

którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Działania niepożądane

Rumień, pieczenie skóry.

Ostrzeżenia

- Nie należy stosować leku Traumon w przypadku uszkodzeń skóry lub wypryskowych zmian zapalnych na skórze oraz na błony śluzowe lub oczy.
- Podczas leczenia oraz w okresie dwóch tygodni po leczeniu należy unikać ekspozycji leczonych miejsc na słońce lub solarium.
- Pacjenci chorzy na astmę, przewlekłą obturacyjną chorobę dróg oddechowych, katar sienny lub przewlekły obrzęk błony śluzowej nosa (tzw. polipy nosa) lub przewlekłą infekcję dróg oddechowych, szczególnie w połączeniu z objawami podobnymi do kataru siennego, mogą stosować Traumon tylko pod warunkiem przestrzegania pewnych środków ostrożności i wyłącznie pod ścisłym nadzorem lekarza.
- Wchłanianie ogólnoustrojowe może zwiększyć się, jeśli lek stosowany jest przez dłuższy czas lub na duże obszary ciała. Należy więc unikać takiego stosowania.
- Glikol propylenowy występujący w składzie leku może powodować podrażnienie skóry.
- Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Producent

MEDA Manufacturing GmbH
Neurather Ring 1
DE-51063 Kolonia Niemcy