

# Tussal Expectorans 0.03 g ,10 tabletek

Cena: 10,23 zł



## Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	10 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	BIOFARM SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Mukolityczne, Przeciwkaszlowe
Rodzaj produktu	Produkt leczniczy
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 6 lat

## Opis produktu

### Opis

**Tussal Expectorans** to lek mukolityczny dostępny w postaci tabletek, przeznaczony dla osób dorosłych oraz dzieci powyżej 6. roku życia. Jego substancją czynną jest ambroksolu chlorowodorek. Działa on poprzez zwiększenie ilości śluzu w drogach oddechowych, jednocześnie zmniejszając jego lepkość i usprawniając funkcjonowanie rzęsek nabłonka oddechowego. W rezultacie leczenia lekiem Tussal Expectorans następuje poprawa transportu śluzu w drogach oddechowych, co przynosi ulgę w kaszlu i ułatwia odkrztuszanie.

### Wskazania

Lek Tussal Expectorans stosuje się wspomagająco w ostrych i przewlekłych chorobach płuc i oskrzeli, które przebiegają z zaburzeniami wydzielania śluzu i utrudnieniami w jego transporcie, np.:

- w ostrym lub przewlekłym zapaleniu oskrzeli, lub płuc,
- w astmie oskrzelowej,
- w rozedmie płuc,
- w mukowiscydozie.

### Działanie

Ułatwienie odkrztuszania, łagodzenie kaszlu.

### Dawkowanie

- Dorośli i dzieci powyżej 12. roku życia: 1 tabletkę 3 razy na dobę przez pierwsze 2-3 dni stosowania, potem 1 tabletkę 2 razy na dobę).
- Dzieci od 6. do 12. roku życia: ½ tabletki 2-3 razy na dobę.

### Skład

1 tabletkę leku zawiera:



- substancję czynną: ambroksolu chlorowodorek 30 mg,
- substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana, magnezu stearynian.

#### Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Tussal Expectorans:

- w przypadku uczulenia na ambroksolu chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- u dzieci poniżej 6 lat.

#### Działania niepożądane

- Często występujące działania niepożądane: biegunka.
- Niezbyt często występujące działania niepożądane: gorączka, wymioty, nudności, bóle brzucha.
- Rzadko występujące działania niepożądane: wysypka, pokrzywka, zgaga, reakcje nadwrażliwości.

#### Ostrzeżenia

- Lek zawiera laktozę - nie stosować w przypadku nietolerancji niektórych cukrów.
- W przypadku: zaburzonej czynności nerek lub ciężkiej niewydolności wątroby, zaburzonego transportu śluzu w oskrzelach, jeśli występowała choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy, stosowanie leku należy omówić z lekarzem.
- W przypadku wystąpienia zmian na skórze lub błonie śluzowej, stosowanie leku należy przerwać.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.
- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

#### Producent

BIOFARM  
Wałbrzyska 13  
Poznań