

Ultrapiryna Plus Lek stosowany w leczeniu objawów przeziębienia i grypy 12 sztuk

Cena: 20,53 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	12 sasz.
Postać	prosz.mus.
Producent	US PHARMACIA SP. Z O.O.

Opis produktu

Wskazania

lek jest wskazany w leczeniu objawów przeziębienia i grypy oraz: gorączki, bólów mięśni i stawów, działa: przeciwbólowo, przeciwgorączkowo, przeciwzapalnie, smak malinowy

Składniki

Każda saszetka zawiera: kwas acetylosalicylowy - 500 mg, kwas askorbowy (witamina C) - 300 mg, wapń (w postaci wapnia laktoglukonianu) - 200 mg oraz substancje pomocnicze, w tym sodu wodorowęglan, aspartam (E951) oraz sacharozę i koszenilę (E120) w składzie barwnika i aromatu - szczegółowe informacje w ulotce

Stosowanie

Dawkowanie i droga podania:

Podanie doustne. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Dorośli: 1 lub 2 saszetki. W razie konieczności dawkę można powtarzać co 4 do 8 godzin do 3 razy na dobę. Maksymalna dawka dobową to 6 saszetek.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat): 1 saszetka.

W razie konieczności dawkę można powtarzać co 4 do 8 godzin do 3 razy na dobę. Maksymalna dawka dobową to 3 saszetki.

Młodzież w wieku powyżej 12 lat - wyłącznie na zlecenie lekarza: 1 saszetka.

W razie konieczności dawkę można powtarzać co 4 do 8 godzin do 3 razy na dobę. Maksymalna dawka dobową to 3 saszetki.

Zawartość jednej saszetki rozpuścić w połowie szklanki letniej wody, wymieszać i wypić.

Przyjmować po posiłku.

Nie stosować dłużej niż 3-5 dni bez konsultacji lekarskiej.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Przechowywanie



Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Przeciwwskazania

Ostrzeżenia: Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat.

Producent

US Pharmacia Sp. z o.o.

Opis

Ultrapiryna Plus Lek stosowany w leczeniu objawów przeziębienia i grypy 12 sztuk