

Ung. Undecylenicum 30 g

Cena: 18,35 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	30 g
Postać	Maść
Producent	CHEMA-ELEKTROMET SPÓŁDZ.PRACY
Przeznaczenie	Odmrożenia, Oparzenie, Otarcia, Rana, Skaleczenie
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 12 lat

Opis produktu

Opis

Unguentum undecylenicum to maść przeznaczona do miejscowego stosowania na skórę. Jej skład zawiera aktywne substancje, takie jak kwas undecylenowy i cynk undecylenian, które wykazują właściwości grzybobójcze wobec dermatofitów, w tym różnych rodzajów *Epidermophyton floccosum*, *Trichophyton* i *Microsporum*. Ten lek nie tylko wpływa na grzybnię, ale również skutecznie działa na zarodniki grzybów.

Wskazania

Lek stosuje się zapobiegawczo i leczniczo w miejscowym leczeniu:

- grzybicy skóry pachwin, stóp, dłoni, głowy,
- powierzchniowych postaci grzybicy strzygącej,
- łupieżu pstrego.

Działanie

Przeciwgrzybicze.

Dawkowanie

Zmienione chorobowo miejsce pokryć cienką warstwą maści 2-4 razy na dobę.

- Nie stosować dłużej niż 7 dni.
- Po zastosowaniu leku, umyć ręce.

Skład

1 g maści zawiera:

- substancje czynne: kwas undecylenowy 50 mg, cynk undecylenianu 200 mg,

- pozostałe składniki to: wazelina biała, euceryna bezwodna, metylu parahydroksybenzoesan (E 218), etylu parahydroksybenzoesan (E 214).

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Unguentum Neomycini:

- w przypadku nadwrażliwości na neomycynę lub którąkolwiek z substancji pomocniczych,
- w przypadku uszkodzenia słuchu,
- u osób w podeszłym wieku, niewydolności nerek, chorobach narządu słuchu, zaburzeniach słuchu lub równowagi w wywiadzie (ryzyko działania ototoksycznego),
- u dzieci poniżej 12 lat,
- na duże powierzchnie ciała, na sączące się zmiany chorobowe i owrzodzenia żylakowe,
- nie stosować długotrwale,
- w okresie ciąży i karmienia piersią,
- z innymi lekami ototoksycznymi, nefrotoksycznymi i neurotoksycznymi.

Działania niepożądane

- Mogą wystąpić miejscowe objawy podrażnienia skóry, pieczenie, wysypka,
- Lek może drażnić błony śluzowe.

Ostrzeżenia

- Nie stosować leku przez dłuższy czas (ryzyko oporności bakterii i nadkażenia grzybiczego).
- Lek stosowany na otwarte rany przez dłuższy czas może spowodować ototoksyczność i nefrotoksyczność.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
- Nie przechowywać maści w otwartej saszetce, maść zastosować bezpośrednio po otwarciu saszetki.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Producent

CHEMA-ELEKTROMET
Spółdzielnia Pracy
ul. Przemysłowa 9
35-105 Rzeszów