

Uniben aerozol 30 ml



Cena: 16,14 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	30 ml (but.)
Postać	Aerozol
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE "UNIA" SPÓŁDZIELNIA PRACY
Przeznaczenie	Dezynfekujące (odkażające), Przeciwbólowe, Przeciwzapalne, Znieczulające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Uniben 1,5 mg/ml to aerozol przeznaczony do aplikacji w jamie ustnej w przypadku ostrego stanu zapalnego gardła i jamy ustnej. Produkt działa miejscowo przeciwbólowo, przeciwzapalnie, znieczulająco oraz odkażająco. Głównym składnikiem aktywnym w sprayu Uniben jest benzydamina chlorowodoru. Należy ona do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Benzydamina działa poprzez hamowanie produkcji cytokin prozapalnych, co przekłada się na jej właściwości przeciwzapalne. Dodatkowo, substancja ta stabilizuje błony komórkowe i wykazuje miejscowe działanie znieczulające.

Wskazania

Uniben 1,5 mg/ml, aerozol do stosowania w jamie ustnej, 30 ml wskazany jest do leczenia miejscowych objawów związanych z:

- ostrym zapaleniem gardła,
- ostrym zapaleniem jamy ustnej.

Działanie

Przeciwzapalne, przeciwbólowe, odkażające.

Dawkowanie

- Dzieci poniżej 6 lat: 1 dawka leku na 4 kg masy ciała, stosowana od 2 do 6 razy na dobę. Bez względu na masę ciała, jednorazowo nie należy przekraczać 4 dawek.
- Dzieci od 6 do 12 lat: jednorazowo 4 dawki leku, stosowane od 2 do 6 razy na dobę.
- Młodzież powyżej 12 lat oraz dorośli: jednorazowo od 4 do 8 dawek leku, stosowane od 2 do 6 razy na dobę.

Skład

1 ml roztworu zawiera:



- substancję czynną: benzydaminę chlorowodorek 1,5 mg,
- substancje pomocnicze: glicerol (E 422), sacharyna sodowa, sodu wodorowęglan, etanol 96%, metylu parahydroksybenzoesan (E 218), polisorbit 20, aromat miętowy (aromat „fresh peppermint” 506041T) (zawiera m.in. alkohol benzylowy, cytral, cytronellol, eugenol, geraniol, d-limonen, linalol), woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Leku Uniben nie należy stosować u osób nadwrażliwych na benzydaminę chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Działania niepożądane

Bardzo rzadko lub z częstotliwością nieznaną jako działania niepożądane mogą pojawić się: uczucie pieczenia błony śluzowej jamy ustnej, suchość w jamie ustnej, nudności oraz wymioty, reakcje nadwrażliwości, zaburzenia czucia, drętwienie, zawroty głowy, bóle głowy, wysypka.

Ostrzeżenia

- Lek zawiera metylu parahydroksybenzoesan, który może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego), a także małe ilości etanolu (alkoholu), mniej niż 100 mg na dawkę.
- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C
- Uniben można stosować w ciągu 6 miesięcy od daty pierwszego użycia.

Producent

UNIA
Chłodna 56/60
Warszawa