

Urofuraginum 50 mg, 30 tabletek

Cena: 19,04 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	30 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	ADAMED PHARMA S.A.
Przeznaczenie	Infekcja, Zakażenie
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

UroFuraginum to lek dostępny w formie tabletek, używany w leczeniu bakteryjnych infekcji dolnych dróg moczowych. Głównym składnikiem aktywnym tego preparatu jest furazydyna, znana również jako furagina, substancja należąca do grupy nitrofuranów, charakteryzująca się szerokim zakresem działania przeciwbakteryjnego. Jej efekty polegają na hamowaniu wzrostu szkodliwych bakterii w obrębie dróg moczowych.

Wskazania

Zakażenia dolnych dróg moczowych. u osób dorosłych.

Działanie

Przeciwbakteryjne.

Dawkowanie

Dorośli: pierwszy dzień leczenia - 2 tabletki 4 razy na dobę; kolejne dni - 2 tabletki 3 razy na dobę.

Skład

1 tabletkę zawiera:

- substancję czynną: furazydynę 50 mg,
- pozostałe składniki: skrobia kukurydziana, sacharoza, krzemionka koloidalna bezwodna, kwas stearynowy.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku UroFuraginum:

- Jeśli pacjent jest uczulony (nadwrażliwy) na furaginę, inne pochodne nitrofuranu lub którykolwiek z pozostałych składników leku uroFuraginum.
- W I trymestrze ciąży.

- W okresie donoszonej ciąży (od 38 tygodnia) i porodu, ze względu na ryzyko niedokrwistości hemolitycznej (niedokrwistości związanej z rozpadem krwinek czerwonych) u noworodka.
- U dzieci i młodzieży.
- Jeśli u pacjenta występuje niewydolność nerek, a w badaniach laboratoryjnych stwierdzono klirens kreatyniny poniżej 60 ml/min lub podwyższony poziom kreatyniny w surowicy.
- Jeśli u pacjenta występuje rozpoznana polineuropatia (zaburzenie układu nerwowego), np. w przebiegu cukrzycy.
- Jeśli u pacjenta występuje niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej (enzymu biorącego udział w przemianach zachodzących w krwinkach czerwonych).

Działania niepożądane

- Nudności, nadmierne oddawanie gazów;
- Bóle głowy.

Ostrzeżenia

- Przy długotrwałym stosowaniu leku, należy wykonać badanie krwi (w celu kontroli liczby białych krwinek) oraz czynności nerek i wątroby.
- Zastosowanie leku skonsultować z lekarzem lub farmaceutą, jeśli u pacjenta występują: zaburzenia czynności nerek, wątroby, zaburzenia układu nerwowego, zaburzenia elektrolitowe, niedobór witamin z grupy B, kwasu foliowego.
- U pacjentów z cukrzycą, furazydyna może spowodować uszkodzenie nerwów.
- Reakcje przewlekłe mogą występować u pacjentów, stosujących furazydynę dłużej niż 6 miesięcy.
- Lek zawiera sacharozę.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Producent

Adamed Pharma S.A.
ul. M. Adamkiewicza 6A,
Pieńków, 05-152 Czosnów