

Venożel żel 100g

Cena: 43,17 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	VENOŻEL
Opakowanie	100 g
Postać	Żel
Producent	BAUSCH HEALTH IRELAND LTD.
Przeznaczenie	Ból, Stan zapalny, Stłuczenie, Zapalenie, Zwichnięcie
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Venożel to produkt, który działa łagodząco na obrzęki, w tym te wynikające z zastoinowej niewydolności kończyn dolnych, a także te pooperacyjne lub po urazach. Dodatkowo, lek łagodzi ból i stan zapalny w żyłach kończyn dolnych oraz uszczelnia naczynia krwionośne. W składzie Venożelu znajdują się aż trzy substancje czynne, które mają działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne oraz przeciwobrzękowe.

Wskazania

- Zapalenia żył kończyn dolnych.
- Obrzęki pooperacyjne i pourazowe.
- Obrzęki zastoinowe kończyn dolnych.
- Zespoły bólowe związane z chorobami kręgosłupa

Działanie

- Przeciwbólowe.
- Przeciwzapalne.
- Przeciwobrzękowe

Dawkowanie

Venożel należy stosować miejscowo na skórę, u dorosłych 3 do 4 razy na dobę, w odstępach kilkugodzinnych. Ilość użytego żelu należy dostosować do rozmiarów miejsca zmienionego chorobowo. Najczęściej zaleca się jednorazowo użyć pasek żelu o długości około 4 cm. Po aplikacji, produkt leczniczy rozprowadzić i delikatnie wmasować do całkowitego wchłonięcia. Po zastosowaniu produktu należy umyć ręce, chyba, że to ręce są miejscem leczonym.



Skład

1g żelu zawiera:

- 12mg diklofenaku sodowego (Diclofenacumnatricum), 10mg trybenozydu (Tribenosidum), 5mg escyny (Escinum),
- substancje pomocnicze: metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, karbomer, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona

Przeciwwskazania

Nie stosować Venożelu u pacjentów z nadwrażliwością na diklofenak, trybenozyd, escynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku. Przeciwwskazaniami do zastosowania leku są: uszkodzenia, zmiany zapalne skóry oraz otwarte rany, a także występowanie napadów astmy, pokrzywki czy ostrych nieżytów nosa po kwasie acetylosalicylowym albo innych NLPZ.

Działania niepożądane

- miejscowe podrażnienie skóry (rumień, pieczenie, świąd, wysypka, reakcje nadwrażliwości na światło, obrzęk), które przemijają po zaprzestaniu stosowania leku.

Ostrzeżenia

- Nie stosować leku do oczu lub na błony śluzowe. W przypadku, gdy żel dostanie się we wspomniane miejsca należy obficie spłukiwać wodą.
- W czasie terapii oraz 2 tygodnie po jej zakończeniu zaleca się unikania bezpośredniej ekspozycji na słońce i światła solarium.
- Venożel zawiera metylu parahydroksybenzoesan oraz propylu parahydroksybenzoesan, które mogą powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.