

# Venożel żel 50g

Cena: 25,94 zł



## Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	VENOŻEL
Opakowanie	50 g (tub.)
Postać	Żel
Producent	BAUSCH HEALTH IRELAND LTD.
Przeznaczenie	Ból, Stan zapalny, Stłuczenie, Zapalenie, Zwichnięcie
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

## Opis produktu

### Opis

**Venożel** to produkt, który działa łagodząco na obrzęki, w tym te wynikające z zastoinowej niewydolności kończyn dolnych, a także te pooperacyjne lub po urazach. Dodatkowo, lek łagodzi ból i stan zapalny w żyłach kończyn dolnych oraz uszczelnia naczynia krwionośne. W składzie Venożelu znajdują się aż trzy substancje czynne, które mają działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne oraz przeciwobrzękowe.

### Wskazania

- Zapalenia żył kończyn dolnych.
- Obrzęki pooperacyjne i pourazowe.
- Obrzęki zastoinowe kończyn dolnych.
- Zespoły bólowe związane z chorobami kręgosłupa

### Działanie

- Przeciwbólowe.
- Przeciwzapalne.
- Przeciwobrzękowe

### Dawkowanie

Venożel należy stosować miejscowo na skórę, u dorosłych 3 do 4 razy na dobę, w odstępach kilkugodzinnych. Ilość użytego żelu należy dostosować do rozmiarów miejsca zmienionego chorobowo. Najczęściej zaleca się jednorazowo użyć pasek żelu o długości około 4 cm. Po aplikacji, produkt leczniczy rozprowadzić i delikatnie wmasować do całkowitego wchłonięcia. Po zastosowaniu produktu należy umyć ręce, chyba, że to ręce są miejscem leczonym.



## Skład

1g żelu zawiera:

- 12mg diklofenaku sodowego (Diclofenacumnatricum), 10mg trybenozydu (Tribenosidum), 5mg escyny (Escinum),
- substancje pomocnicze: metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, karbomer, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona

## Przeciwwskazania

Nie stosować Venożelu u pacjentów z nadwrażliwością na diklofenak, trybenozyd, escynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku. Przeciwwskazaniami do zastosowania leku są: uszkodzenia, zmiany zapalne skóry oraz otwarte rany, a także występowanie napadów astmy, pokrzywki czy ostrych nieżytów nosa po kwasie acetylosalicylowym albo innych NLPZ.

## Działania niepożądane

- miejscowe podrażnienie skóry (rumień, pieczenie, świąd, wysypka, reakcje nadwrażliwości na światło, obrzęk), które przemijają po zaprzestaniu stosowania leku.

## Ostrzeżenia

- Nie stosować leku do oczu lub na błony śluzowe. W przypadku, gdy żel dostanie się we wspomniane miejsca należy obficie spłukiwać wodą.
- W czasie terapii oraz 2 tygodnie po jej zakończeniu zaleca się unikania bezpośredniej ekspozycji na słońce i światła solarium.
- Venożel zawiera metylu parahydroksybenzoesan oraz propylu parahydroksybenzoesan, które mogą powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

## Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.