

Zincas forte 150 mg, 50 tabletek

Cena: 22,21 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	ZINCAS
Opakowanie	50 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	ZAKŁ. CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNY "FARMAPOL" SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Niedobór minerałów, Obniżona odporność, Wypadanie włosów
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 15 lat

Opis produktu

Opis

Zincas Forte to lek w postaci tabletek, którego substancją czynną jest cynk. Niedobór tego pierwiastka w organizmie może prowadzić do zaburzeń w funkcjonowaniu skóry, układu pokarmowego, układu nerwowego, układu odpornościowego i układu kostnego. Znaczny niedobór cynku może nawet skutkować karłowatością i niedorozwojem narządów płciowych. Cynk, jako mikroelement, odgrywa rolę w regulacji wytwarzania hormonu wzrostu oraz hormonów płciowych. Ponadto wpływa na zmniejszenie podatności organizmu na zakażenia i alergię oraz wspiera prawidłowe wydzielanie insuliny.

Wskazania

Uzupełnianie niedoboru cynku w organizmie.

Działanie

Cynk jest mikroelementem. Reguluje wytwarzanie hormonu wzrostu oraz hormonów płciowych (jest niezbędny do wytwarzania plemników i komórek jajowych). Zmniejsza podatność organizmu na zakażenia i alergię. Wpływa na prawidłowe wydzielanie insuliny przez trzustkę.

Dawkowanie

Młodzież powyżej 15 lat i dorośli: 1 tabletkę na dobę.

Skład

1 tabletkę zawiera:

- substancja czynna: 27 mg jonów cynku w postaci 150 mg cynku wodorooasparaginianu dwuwodnego,
- pozostałe składniki to: skrobia ziemniaczana, sacharoza, talk, magnezu stearynian, dekstryna, karboksymetyloskrobia sodowa

(typ C), celuloza mikrokrystaliczna.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Zincas forte:

- w przypadku nadwrażliwości na cynku wodorooasparaginian dwuwodny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- w przypadku stwierdzonej niewydolności nerek,
- jeśli pacjent stosuje niektóre leki, np. antybiotyki.

Działania niepożądane

- ból brzucha, biegunka, nudności,
- ból głowy,
- metaliczny posmak w ustach.

Ostrzeżenia

- Długotrwałe stosowanie leku może wiązać się z niedoborem miedzi i niedokrwistością.
- Lek stosowany w większych dawkach niż zalecane może wiązać się z dolegliwościami przewodu pokarmowego jak biegunka, nudności czy bóle brzucha.
- Lek zawiera sacharozę - pacjenci z cukrzycą powinni wziąć to pod uwagę.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Producent

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Farmapol Sp. z o.o.
ul. Święty Wojciech 29
61-749 Poznań