

Zyrtec UCB 10 mg, 10 tabletek

Cena: 14,21 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	ZYRTEC
Opakowanie	10 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	VEDIM SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwalergiczne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 6 lat

Opis produktu

Opis

Zyrtec UCB to preparat przeciwalergiczny, którego skład obejmuje cetyryzynę. Lek ten jest używany do złagodzenia objawów sezonowego i przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa oraz pokrzywki. Zyrtec UCB może być stosowany u dzieci powyżej 6. roku życia oraz u osób dorosłych. Przed zastosowaniem leku zaleca się skonsultowanie się z lekarzem, zwłaszcza jeśli chodzi o dzieci.

Wskazania

Łagodzenie objawów alergii dotyczących nosa i oczu związanych z sezonowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa oraz łagodzenie objawów alergii na skórze (pokrzywka) u dorosłych oraz dzieci w wieku 6 lat i starszych.

Działanie

Przeciwalergiczne.

Dawkowanie

- Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 1 tabletka (10 mg) raz na dobę.
- Dzieci w wieku 6-12 lat: 1/2 tabletki (5 mg) dwa razy na dobę.

Skład

1 tabletka zawiera:

- substancję czynną: cetyryzyny dichlorowodorek 10 mg,
- pozostałe składniki: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, Opadry Y-1-7000 (hypromeloza (E 464), tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 400).

Przeciwwskazania



Kiedy nie stosować leku Zyrtec UCB:

- jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba nerek (ciężka niewydolność nerek z klirensiem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min),
- u osób uczulonych na dichlorowodorek cetyryzyny, hydroksyzynę lub pochodne piperazyny (substancje czynne o podobnej budowie, wchodzące w skład innych leków) albo którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Działania niepożądane

Często występujące działania niepożądane: senność, zawroty głowy, bóle głowy, zapalenie gardła, zapalenie błony śluzowej nosa (u dzieci), biegunka, nudności, suchość w jamie ustnej, zmęczenie.

Niezbyt często występujące działania niepożądane: pobudzenie, parestezja (zaburzenia czucia), ból brzucha, świąd, wysypka, astenia (skrajne zmęczenie), złe samopoczucie.

Ostrzeżenia

- Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem, jeśli pacjent cierpi na niewydolność nerek, problemy z oddawaniem moczu, choruje na padaczkę lub występuje ryzyko pojawienia się drgawek.
- Zyrtec UCB zawiera laktozę, więc jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Dodatkowe informacje

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Producent

VEDIM SP.Z O.O.
Leona Kruczkowskiego 8
Warszawa